

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アラセナ S
2	成分・分量	<1g中>ビダラビン 30mg
3	用法・用量	1日1～4回、患部に適量を塗布する。(唇やそのまわりにピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら、すぐに塗布する) *早期に使用すると治りが早く、ひどくなりにくいため、ピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら出来るだけ早く(5日以内)に使用を開始してください。 *使用時期は毎食後、就寝前を目安にご使用ください。
4	効能・効果	口唇ヘルペスの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください (1) 医師による口唇ヘルペスの診断・治療を受けたことのない人。 (2) 患部が広範囲の人。 (3) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4) 6歳未満の乳幼児。 (5) 発熱、広範囲の発疹等の全身症状がみられる人。</p> <p>2. 口唇や口唇周辺以外の部位には使用しないでください</p> <p>3. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 授乳中の (4) 本人又は家族がアレルギー体质の人。 (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことのある人。 (6) 潤滑やただれがひどい人。 (7) アトピー性皮膚炎の人。</p> <p><用法・用量に関する注意></p> <ul style="list-style-type: none"> ・目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。 ・外用にのみ使用してください。 ・口に入れたり、なめたりしないでください。 ・家族で初めて発症したと思われる人が誤って使用しないよう、十分注意してください。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。