医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第1類医薬品	使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アクチビア®軟膏
2	成分・分量	1g中 アシクロビル 50mg
3	用法・用量	1日3～5回、適量を患部に塗布する。(唇やそのまわりにピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら、すぐに塗布する)
4	効能・効果	口唇ヘルペスの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. アクチビア軟膏が使用できるかどうかを確認してください(以下の項目に該当する場合は本剤を使用することができません。医師の治療を受けてください。) □過去に、病院で口唇ヘルペスと診断されたことがない。 □こういう症状が初めてである。 □患部が広範囲である。 □水疱(水ふくれ)が大きい(小豆大)。 □頭痛や、ひどい痛みがある。 □アシクロビルまたはバラシクロビル塩酸塩製剤にアレルギー症状を起こしたことがある。 □使用者は6歳未満の乳幼児である。 □患部が唇とそのまわりをのぞく部位である。 次に該当する方はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)授乳中の人。 (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。 (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (6)湿潤やただれがひどい人。 (7)アトピー性皮膚炎の人。 ●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 ●目に入らないように注意してください。外用のみに使用してください。 ●口に入っても害はありませんが、なるべく口に入れたり、なめたりしないでください。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。