医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

<table>
<tr><td>1</td><td>名称</td><td>チクナインa</td></tr>
<tr><td>2</td><td>成分・分量</td><td>1日量（2包：4g 中） 辛夷清肺湯エキス・・・2．0g
シンイ・・・・1．5g　チモ・・・・・・1．5g　ビャクドウ・・・1．5g
オウゴン・・1．5g　サンシシ・・・0．75g　バクモンドウ・・・3．0g
セッコウ・・・3．0g　ショウマ・・・0．75g　ビワヨウ・・・0．5g　より抽出
添加物として、ケイ酸 Al、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸 Mg、乳糖を含有する
●本剤は天然物（生薬）を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります</td></tr>
<tr><td>3</td><td>用法・用量</td><td>次の量を朝夕、食前または食間に水又はお湯で服用してください
<table>
<tr><td>年齢</td><td>1回量</td><td>服用回数</td></tr>
<tr><td>大人（15才以上）</td><td>1包</td><td rowspan="4">1日2回</td></tr>
<tr><td>7才以上15才未満</td><td>2/3包</td></tr>
<tr><td>4才以上7才未満</td><td>1/2包</td></tr>
<tr><td>2才以上4才未満</td><td>1/3包</td></tr>
<tr><td>2才未満</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr>
</table>
＜用法・用量に関連する注意＞
（1）定められた用法・用量を厳守すること
（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます</td></tr>
<tr><td>4</td><td>効能・効果</td><td>鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）</td></tr>
<tr><td>5</td><td>保健衛生上の危害を防止するために必要な事項</td><td>＜相談すること＞
1．次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
（1） 医師の治療を受けている人
（2） 妊婦または妊娠していると思われる人
（3） 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
（4） 胃腸虚弱で冷え症の人
2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
<table>
<tr><td>関係部位</td><td>症状</td></tr>
<tr><td>消化器</td><td>食欲不振、胃部不快感</td></tr>
</table>
まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること
<table>
<tr><td>症状の名称</td><td>症状</td></tr>
<tr><td>間質性肺炎</td><td>階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなす、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする</td></tr>
<tr><td>肝機能障害</td><td>発熱、かゆみ、発疹、黄だん（皮ふや白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる</td></tr>
<tr><td>腸間膜静脈硬化症</td><td>長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感等が繰り返しあらわれる</td></tr>
</table>
3．1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</td></tr>
<tr><td>6</td><td>薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項</td><td></td></tr>
</table>

〔注意事項〕

1．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2．情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。

3．使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。