

医薬品を正しく購入するための 説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	リアップ®X5プラスローション
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 5.0g ピリドキシン塩酸塩 0.05g トコフェロール酢酸エステル 0.08g l-メントール 0.3g
3	用法・用量	成人男性（20才以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none">1. 次の人は使用しないでください<ol style="list-style-type: none">(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 女性。(3) 未成年者（20才未満）。(4) 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。(5) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。2. 次の部位には使用しないでください<ol style="list-style-type: none">(1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。(2) きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください4. 次に該当する人はお申し出ください<ul style="list-style-type: none">・今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。・高血圧の人、低血圧の人。・心臓又は腎臓に障害のある人。・むくみのある人。・家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。・高齢者（65才以上）。・次の診断を受けている人。 甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）。
6	薬剤師が必要と判断する事項	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: 0;"><p>〈ご使用にあたって〉</p><p>お使いになる方の髪質や1ヵ所への集中塗布などにより、ごわつき感が出たり、くし通りが悪くなったり、部分的に白くなる（成分の結晶化）ことがあります。毎日洗髪を行い、頭皮を清潔にして、用法・用量を守ってお使いください。</p></div>

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。



包装 60mL

〈商品特長〉

- ◆有効成分ミノキシジルを5%配合することにより、優れた発毛効果を発揮します。
- ◆ミノキシジルの他に、清涼感を与え、頭皮の発毛環境を整える、3つの有効成分（ピリドキシン塩酸塩、トコフェロール酢酸エステル、*l*-メントール）を配合しています。
- ◆キャップを開け、頭皮に押しあてるだけで、1回量の1mLを計量できる容器です。