医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

要指導医薬品	使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名　称	アンチスタックス
2	成分・分量	2カプセル（1日量）中 赤ブドウ葉乾燥エキス混合物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450mg （赤ブドウ葉乾燥純エキス360mg に相当）
3	用法・用量	成人（20才以上）1回2カプセルを1日１回、朝に水又はぬるま湯で服用して下さい。 20才未満は服用しないで下さい。
4	効能・効果	軽度の静脈還流障害（静脈の血流が滞ること）による次の諸症状の改善： 足（ふくらはぎ、足首など）のむくみ、むくみに伴う足のだるさ・重さ・疲れ・つっぱり感・痛み
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1．次の人は服用しないで下さい （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （2）妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。 （3）20才未満の人。 （4）足以外のむくみ、又は全身にむくみのある人。 （5）足に激しい痛み、出血、色素沈着、びらんのある人。また足の皮膚が褐色調に変化したり、硬くなった人。 （6）次の診断を受けた人。 心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、脳血管障害、動脈硬化症 （7）乳癌、子宮癌等の手術(リンパ節切除)や放射線治療を受けたことがある人。 （8）抗血小板剤(アスピリン、チクロピジン塩酸塩等)、抗凝血剤(ワルファリン、ヘパリン等)、血栓溶解剤(ウロキナーゼ等)で治療を受けている人。 2．本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい かぜ薬、解熱鎮痛薬 3．授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい 次に該当する人はお申し出下さい ・医師の治療を受けている人。 ・60才以上の人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 息切れ、動悸、倦怠感、黄疸、尿量減少、血尿、貧血
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2．使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。