医薬品を正しく購入するための

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	プリズマホルモン軟膏
2	成分・分量	本品1g中 「局外規」テストステロン・・・・・・・・・・・・・・・ 10mg 添加物：親水ワセリン、エタノール
3	用法・用量	表皮の薄い部分や其(その)他の患部[注)]をきれいにし、1回約0.1g（小豆大）を1日1～2回、手にとってすりこんで下さい。 注）その他の患部：亀頭部、陰嚢（睾丸）など
4	効能・効果	男性ホルモン分泌不足による神経衰弱諸症、男性更年期諸症、男性老衰現象の予防及び恢復（快復）、恥部無毛症
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないこと （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 （2）ご使用前に本剤をチューブから5mm程度出し、内股などの皮膚のうすい所にすり込んで、翌日中に発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状があらわれた人 （3）アンドロゲン依存性悪性腫瘍［例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍（悪性）］及びその疑いのある人 （4）女性 （5）15歳未満の小児 （6）排尿困難を伴う前立腺肥大のある人 （7）前立腺検査※の結果、前立腺特異抗原（PSA）の値が2．0ng/mL 以上の人（医師の判断に従うこと）。※有効成分（テストステロン）は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります。 a)特に50歳以上の男性は前立腺腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります。 b)継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります。 c)検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師又は薬剤師に相談すること （8）睡眠時無呼吸症候群である人 2. 次の部位には使用しないこと （1）目や目の周囲、粘膜（口腔、鼻腔等） （2）陰茎部先端（尿道口） （3）外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位 3. 本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないこと 4. 使用者以外へ付着させないこと （1）ご使用後は石鹸とぬるま湯で手を十分に洗って下さい。 （2）本剤を使用者以外の人に付着させないように注意して下さい。付着した場合は直ちに洗い流して下さい。 （3）塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹸とぬるま湯で十分に洗い流して下さい。 次に該当する人はお申し出下さい (1)医師の治療を受けている人 (2)前立腺肥大症ではあるが，排尿困難を伴わない人 (3)薬や化粧品などによりアレルギー症状（発疹・発赤，かゆみ，かぶれ，はれ等）を起こしたことがある人。 (4)重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧または既往歴のある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。