

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	トノス
2	成分・分量 (本品 1g 中)	本品 1g 中 テストステロン 10mg、アミノ安息香酸エチル 100mg、プロカイン塩酸塩 5mg、ジブカイン塩酸塩 10mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩 5mg を含有する。 添加物として白色ワセリンを含有する。
3	用法・用量	男子更年期障害には患部又は皮膚柔軟部に毎日一回、約 0.1 瓦(小豆大)ずつよくすりこむように塗擦し、好転したら隔日又は週 2 回にする。男性性器神経衰弱症(早漏、勃起力減退等)で直接性器に塗る。 【詳しいご使用方法】 ●早漏等射精時間の遅延化: 行為 20~30 分前に 5mm を亀頭部(亀頭冠)によくすり込むように塗る。麻ひ感が生じたら石鹼などで洗い落とすこと。なるべく少量から使用すること(まれに効きすぎて勃起力が低下することがある)。 ●勃起力減退、精力減退等の症状の改善: 1 日 1 回、5mm を陰のう部全体によくすり込むように塗る。改善が認められたら、1 日おきか週 2 回程度に塗る回数を減らす。
4	効能・効果	男子更年期障害、男性性器神経衰弱症(早漏、勃起力減退、性器不全、精力減退、遺精、夢精等)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ご使用前に本剤をチューブから 5mm 程度出し、内股などの皮膚のうすい所にすり込んで、翌日中に蕁瘍、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人。(3) 前立腺腫瘍、乳腫瘍(悪性)及びその疑いのある人。(4) 排尿困難を伴う前立腺肥大のある人。(5) 前立腺検査の結果、前立腺特異抗原(PSA)の値が 2.0ng/mL 以上の人(医師の判断に従うこと)。(6) 睡眠時無呼吸症候群である人。(7) 女性。(8) 小児(15 歳未満)。 2. 次の部位には使用しないこと (1) 目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻孔等)。(2) 陰茎部先端(尿道口)。(3) 外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある患部。 3. 本剤を使用している間は、抗凝血薬(ワルファリンカリウム等)を使用しないこと 4. 使用者以外へ付着させないこと (1) ご使用後は石鹼とぬるま湯で手を十分に洗ってください。(2) 本剤を使用者以外的人に付着させないように注意してください。付着した場合は直ちに洗い流してください。(3) 塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹼とぬるま湯で十分に洗い流してください。 5. 内服用に使用しないこと 6. 本剤が出すぎた場合は、チューブに戻さないこと
6	薬剤師が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。