

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための
説明文書

劇

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	劇 (カプセル)
2	成分・分量	1 (カプセル) 中 塩酸ヨヒンビン 6mg、硝酸ストリキニーネ 0.5mg、反鼻末 153.5mg、パントテン酸カルシウム 50mg 添加物としてカプセルにゼラチン、赤色3号、黄色4号 (タートラジン)、青色1号、酸化チタン硫酸Na及び亜硫酸水素Naを含有する。
3	用法・用量	成人は1日1回1カプセルを服用してください。
4	効能・効果	神経衰弱性陰萎、老衰性陰萎、衰弱性射精
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の方は服用しないで下さい。</p> <p>(1) 心臓及び血管系に障害のある人 (2) 血圧が90/50mmHgより低い人 (3) 生殖器系に障害がある人 (4) 脳梗塞、脳出血等や心筋梗塞を起こして6ヶ月以上経っていない人 (5) 本剤を服用してアレルギー症状 (例えば発熱・発赤、かゆみ等) を起こしたことがある人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の勃起不全治療剤</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	<p>1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人 (2) 高血圧の人 (3) 持病のある人、体の弱っている人または高熱のある人 (4) 高齢者 (5) 本人又は家族がアレルギー体质の人 (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>2. 次の場合には、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。</p> <p>(1) 服用後、次の症状があらわれた場合 [関係部位 : 症状] 皮ふ : 発疹・発赤、かゆみ 消化器 : 悪心・嘔吐、食欲不振、嚥下困難 精神神経系 : 頭痛、めまい、疲労 その他 : ぜんそく、筋肉の硬直、筋痛 まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は、直ちに医師の診療を受けて下さい。 [症状の名称 : 症状] ショック (アナフィラキシー) : 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 (2) 1ヶ月服用しても症状が良くならない場合</p> <p>3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。 口のかわき</p>

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合 (副作用など) には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。