

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

ナシビン
Mスプレー®

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名称	ナシビン M スプレー
2	成分・分量	<100mL 中>オキシメタゾリン塩酸塩 0.05g
3	用法・用量	下記の1回量を各鼻腔に噴霧してください。なお、適用間隔は、10～12時間以上おいてください。連続して1週間を超えて使用しないでください。使用を中止した場合は2週間以上あけてください。症状が改善したら使用を中止してください。 <1回使用量>成人(15歳以上) 各鼻腔に2～3度ずつ、15才未満は使用しないでください。 <1日使用回数>1～2回噴霧してください。
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による鼻づまり
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1)本剤に対しアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)を服用している人。 (3)15歳未満の小児。 2. 連続して1週間を超えて使用しないでください(本剤の連用により鼻粘膜障害が発現するおそれがあります) 3. 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期連用又は大量使用しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。 (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障 <用法・用量に関連する注意> (1)定められた用法・用量を厳守してください。 (2)本剤は作用時間が長く、1日1～2回の使用で効果を示します。過度に使用しますと、かえって鼻づまりを起こすことがあります。 (3)点鼻用にのみ使用してください。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

(注意事項)

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。