

BULLETIN D'ANALYSE

LAVANDULA LATIFOLIA

Lavande aspic à cinéole

Lot N° B1014S29

Définition: Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur d'eau des sommités fleuries de l'espèce:

LAVANDULA LATIFOLIA Med.

syn. LAVANDULA SPICA

de la famille des Lamiacées (ex Labiées)

Origine: Espagne BIO

N° CAS TSCA : 8016-78-2

N° CAS EINECS : 84837-04-7

N° EINECS : 284-290-6

INCI : LAVANDULA LATIFOLIA HERB OIL

Huile essentielle inscrite à la Pharmacopée Européenne *

N° de la Norme Internationale/AFNOR : NF ISO 4719 (mai 2013)

Résultats basés sur les informations du fournisseur

SPECIFICATIONS

NF ISO 4719/Pharmacopée

Lot N° B1014S29

Aspect : Liquide mobile, limpide.

Couleur : Jaune clair à jaune vert

Odeur : Caractéristique, rappelant le cinéole et le camphre

Conforme

Jaune pâle

Conforme

	Mini	Maxi	
Densité à 20 °C :	0,894	0,907	0,899
Indice de réfraction à 20°C :	1,461	1,468	1,465
Pouvoir rotatoire à 20°C :	- 7°	+ 2°	- 3,6°
Point éclair : +60°C			

Constituants principaux :

	NF ISO 4719		Pharmacopée *		NF ISO 4719		*
α -pinène		2,09%		β -caryophyllène		1,36%	
camphène		0,30%		terpinène-4-ol		0,35%	
β -pinène		2,25%		acétate trans sabinyle		0,02%	
sabinène		0,33%		trans- β -farnésène		0,48%	
β -myrcène		0,35%		zonarène		0,04%	
α -terpinène		0,14%		δ -terpinéol		0,16%	
limonène	0,5% à 3%	1,03%	0,5% à 3%	néral		0,35%	
1,8-cinéole	16% à 39%	27,13%	16% à 39%	bornéol		0,94%	
cis- β -ocimène		0,17%		α -terpinéol	0,2% à 2%	1,06%	0,2% à 2%
γ -terpinène		0,26%		germacrène D		0,64%	
trans- β -ocimène		0,08%		acétate de géranyle		0,20%	
terpinolène		0,16%		trans- α -bisabolène	0,4% à 2,5%	2,32%	0,4% à 2,5%
trans-thuyanol		0,19%		géraniol		0,05%	
camphre	8% à 16%	11,00%	8% à 16%	paracymène-8-ol		0,02%	
linalol	34% à 50%	41,22%	34% à 50%	oxyde de caryophyllène		0,19%	
acétate de linalyle	<1,6%	0,09%	<1,6%	t-cadinol		0,12%	
acétate de bornyle		0,30%		coumarine		0,09%	
total identifié:			95,48%				

SANRITSU GROUP

SANRITSU CO.,Ltd / 1-3-19 Yabugaoka Hirakata-shi Osaka JAPAN / TEL.0120-082-101