

Aroma Shop

by Mont Saint Michel

BULLETIN D'ANALYSE

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

Lavande fine – Diois Haute altitude

Lot N° N1010T30

Définition: Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur d'eau des sommités fleuries récemment coupées de l'espèce:

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA *P.Miller.*
syn. LAVANDULA VERA ou OFFICINALIS

de la famille des Lamiacées (ex Labiées)

Origine: France – Diois Haute altitude

N° CAS TSCA : 8000-28-0

N°CAS EINECS : 90063-37-9

N° EINECS : 289-995-2

INCI : LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL

Résultats basés sur les informations du fournisseur.

SPECIFICATIONS

Lot N° N1010T30

| | | |
|------------------|--|--------------------|
| Aspect : | Liquide mobile, limpide. | Conforme |
| Couleur : | Jaune clair à jaune orangé | Jaune clair |
| Odeur : | Caractéristique, fleurie, rappelant celle des sommités fleuries de la plante | Conforme |

| | Mini | Maxi | |
|--------------------------------------|---------|-------|---------------|
| Densité à 20 °C : | 0,880 | 0,890 | 0,885 |
| Indice de réfraction à 20°C : | 1,458 | 1,464 | 1,4599 |
| Pouvoir rotatoire à 20°C : | - 11,5° | - 7° | -9,3° |

Constituants principaux :

| | | | |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| α -pinène + α -thuyène | 0,30% | camphre | 0,90% |
| camphène | 0,20% | linalol | 30,40% |
| β -pinène | 0,20% | acétate de linalyle | 36,00% |
| sabinène | 0,10% | α santalène | 0,60% |
| δ -3-carène | 0,10% | β -caryophyllène | 3,60% |
| β -myrcène | 0,50% | terpinène-1-ol-4 | 2,00% |
| limonène | 0,40% | acétate de lavandulyle | 2,80% |
| 1, 8-cinéole | 1,30% | cryptone + α -humulène | 0,30% |
| β -phellandène | 0,20% | lavandulol | 0,60% |
| trans- β -ocimène | 2,70% | bornéol | 1,00% |
| cis- β -ocimène | 4,60% | α -terpinéol | 0,50% |
| octanone-3 | 0,80% | germacrène-D | 0,40% |
| acétate d'hexyle | 0,40% | acétate de néryle | 0,20% |
| α -terpinolène | 0,10% | carvone | 0,10% |
| paracymène | 0,20% | acétate de géranyle | 0,50% |
| acétate d'1-octène-3-yle | 1,20% | nérol | 0,10% |
| butyrate d'hexyle | 0,30% | géraniol | 0,30% |
| 3-octanol | 0,10% | oxyde de caryophyllène | 0,40% |
| butyrate d'hexyle | 0,30% | coumarine | traces (<0,05%) |
| | | total identifié : | 94,70% |

SANRITSU GROUP

SANRITSU CO.,Ltd / 1-3-19 Yabugaoka Hirakata-shi Osaka JAPAN / TEL.0120-082-101