

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ペレウス
2	成分・分量	[100g 中] メチルテストステロン 0.5g
3	用法・用量	1 日 1～2 回適量を患部に塗布してください。 ※頭髪へはご使用できません。 ※内服しないでください。
4	効能・効果	眉毛脱毛、脇窩無毛、恥部無毛、薄毛（まゆ毛・体毛の発毛促進に）
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ご使用前に本剤を適量出し、内股などの皮膚のうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人 (3) 15 歳未満の小児 (4) 妊婦、妊娠している可能性がある女性、授乳中の人 (5) アンドロゲン依存性腫瘍（例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍（悪性））及びその疑いのある人 (6) 排尿困難を伴う前立腺肥大のある人 (7) 前立腺検査※の結果、前立腺特異抗原（PSA）の値が 2.0ng/mL 以上の人（医師の判断に従うこと） ※本剤の有効成分（メチルテストステロン）は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります。 (a) 特に 50 歳以上の男性は前立腺肥大腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります。（b）継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります。（c）検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師又は薬剤師に相談してください。 (8) 睡眠時無呼吸症候群である人 (9) 円形脱毛症の人 2. 次の部位に使用しないこと (1) 目や目の周囲、粘膜（口腔、鼻腔等） (2) 頭髪、まつ毛 (3) 陰茎部先端（尿道口）、恥部の粘膜部 (4) 外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位 3. 本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないこと 4. 使用者以外へ付着させないこと（ご使用後は十分に手を洗ってください） 次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人 ・前立腺肥大症ではあるが、排尿困難を伴わない人 ・本人又は家族が、薬や化粧品などによるアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等）を起こしたことがある人 ・重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧又はその既往歴がある人
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。

第1類医薬品 ペレウス 購入前チェックシート

購入する前に、必ず☑チェックしてください

次の項目がひとつでも「はい」に該当する場合はこの薬をご使用できません。

医療機関を受診してください。

	はい	いいえ
●本剤または本剤の成分に対し、アレルギー症状を起こしたことがありますか？	☐	☐
●15歳未満の小児ですか？	☐	☐
●妊婦、妊娠している可能性がある女性もしくは授乳中の女性ですか？	☐	☐
●アンドロゲン依存性腫瘍（例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍（悪性））及びその疑いがありますか？	☐	☐
●排尿困難を伴う前立腺肥大がありますか？	☐	☐
●前立腺検査の結果、前立腺特異抗原（PSA）の値が 2.0ng/mL 以上でしたか？	☐	☐
●睡眠時無呼吸症候群ですか？	☐	☐
●円形脱毛症ですか？	☐	☐

※チェック項目が全て「いいえ」の場合、このチェックシートの説明や製品に記載された事項をよくお読みになり、購入してください。

成分・分量：100g中 メチルテストステロン 0.5g

（添加物：グリセリン、エタノール、コレステロール、香料）

効能・効果：眉毛脱毛、脇窩無毛、恥部無毛、薄毛（まゆ毛・体毛の発毛促進）

用法・用量：1日1～2回適量を患部に塗布してください。

目に入らないように注意してください

内服しないでください

頭髪には使用しないでください

火気厳禁：アルコール類 危険物等級Ⅱ（エタノール）

お問合せ先

協和新薬株式会社

お客様相談室 TEL 048(942)1445

受付時間 平日9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

使用する前に

●次の人は使用しないでください

- ・本剤または本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人
- ・ご使用前に本剤を適量出し、内股などの皮ふのうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人
- ・15歳未満の小児
- ・妊婦、妊娠している可能性のある女性、授乳中の人
- ・アンドロゲン依存性腫瘍（例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍（悪性））及びその疑いのある人
- ・排尿困難を伴う前立腺肥大のある人
- ・前立腺検査※の結果、前立腺特異抗原（PSA）の値が2.0ng/mL以上の人（医師の判断に従うこと）
※有効成分（メチルテストステロン）は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります。
（a）特に50歳以上の男性は前立腺肥大腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります。
（b）継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります。
（c）検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師または薬剤師に相談してください。
- ・睡眠時無呼吸症候群である人
- ・円形脱毛症の人

●次の部位には使用しないでください

- ・目や目の周囲、粘膜（口腔、鼻腔等）
- ・頭髮、まつ毛
- ・陰茎部先端（尿道口）、恥部の粘膜部
- ・外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位

●本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないでください

●使用者以外へ付着させないでください

- ・ご使用後は石鹸とぬるま湯で手を十分に洗ってください
- ・本剤を使用者以外の人に付着させないように注意してください。付着した場合は直ちに洗い流してください
- ・塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹸とぬるま湯で十分に洗い流してください

●次の人は医師または薬剤師に相談してください

- ・医師の治療を受けている人
- ・前立腺肥大症ではあるが、排尿困難を伴わない人
- ・本人または家族が、薬や化粧品などによるアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等）を起こしたことがある人
- ・重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧またはその既往歴のある人

使用中に

使用後、次の症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

関係部位	症 状
恥部、腋窩（ワキの下）、眉	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等

- 月経異常または、男性化の兆候があらわれた場合
- 1～3カ月使用しても症状の改善がみられない場合
- 誤った使い方をしてしまった場合

保管

- 小児の手の届かないところに保管してください
- 直射日光の当たらない、なるべく涼しいところに密栓をして保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わります）
- 火気に近づけないでください
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください