

医薬品を正しく購入するための
説明文書

要指導医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	エパデールT
2	成分・分量	1包中 イコサペント酸エチル 600mg
3	用法・用量	次の量を食後すぐに服用してください。 20才以上 1回1包 1日3回食後すぐ 20才未満 服用しないこと
4	効能・効果	健康診断等で指摘された、境界領域 ^{注)} の中性脂肪値の改善 注)「境界領域」：健康診断などにおいて中性脂肪が正常値よりもやや高めの値(150mg/dL以上300mg/dL未満)を指す。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次の人は服用しないでください (1) 20才未満の人。 (2) 出血している人。 (血友病、毛細血管脆弱症、消化管潰瘍、尿路出血、喀血、硝子体出血等にて出血している場合、止血が困難となることがあります) (3) 出血しやすい人。(出血を助長することがあります) (4) 手術を予定している人。(出血を助長することがあります) (5) 次の医薬品を服用している人。 ワルファリン等の抗凝血薬、アスピリンを含有するかぜ薬・解熱鎮痛薬・抗血小板薬、インドメタシンを含有する鎮痛消炎薬、チクロピジン塩酸塩やシロスタゾール等の抗血小板薬(出血傾向が強くなることがあります) (6) 脂質異常症(高脂血症)、糖尿病又は高血圧症と診断され現在医師の治療を受けている人、あるいは健康診断等で医師の治療を勧められた人。 (7) 親、兄弟姉妹に原発性高脂血症と診断された人がいる人。 (8) 狹心症、心筋梗塞、脳卒中と診断されたことがある人。 (9) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (10) 授乳中の人。(動物試験で乳汁中への移行が認められています) 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) 医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- (法令により) 要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。



[実物大]

包装 42包

〈商品特長〉

- ◆エバデールTは、医療用成分のイコサペント酸エチルを主成分とし、健康診断等で指摘された境界領域の中性脂肪値を改善するお薬です。
- ◆イコサペント酸エチルには、肝臓での過剰な中性脂肪合成を抑え、血中の余分な中性脂肪の代謝をはやくして中性脂肪の高値を改善する作用があります。また、その他の作用として、動脈のしなやかな弾力性を保持する作用や、血小板の凝集をおさえ血流をスムースな状態に導く作用があります。