

医薬品を正しく購入するための 説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	メディリート
2	成分・分量	1 個中 ミコナゾール硝酸塩 100mg
3	用法・用量	成人（15 才以上 60 才未満）、1 日 1 回 1 個を就寝前に腔深部に挿入してください。なお、6 日間連続して使用してください。ただし、 <u>3 日間</u> 使用しても症状の改善がみられないか、 <u>6 日間</u> 使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。
4	効能・効果	腔カンジダの再発（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	- 次の人は使用しないでください - 初めて発症したと思われる人。 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 15 才未満又は 60 才以上の人。 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。 - 発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色のついた又は血に染まったおりもの、魚臭いおりもの、生理の停止、腔からの不規則又は異常な出血、腔又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれがある人。 - 次の診断を受けた人。 糖尿病 - ワルファリン等の抗凝血剤を服用している人。 - 本疾病を頻繁に繰り返している人。（1～2 ヶ月に 1 回又は 6 ヶ月以内に 2 回以上） - 腔カンジダの再発かわからない人。 - 次の部位には使用しないでください 腔内以外の部位。 - 本剤を使用中に次の医薬品を外陰部に使用しないでください カンジダ治療薬以外の外皮用薬。 - 次に該当する人はお申し出ください - 医師の治療を受けている人。 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 授乳中の人。
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。



〔実物大〕

包装	6 個
----	-----

〈商品特長〉

- ◆メディトリートは、ミコナゾール硝酸塩を主成分とした膣カンジダの再発治療薬です。
- ◆ミコナゾール硝酸塩は、膣カンジダの原因であるカンジダ菌を殺菌し、膣カンジダを治療します。
- ◆膣カンジダの再発によるデリケート部位のおりもの・かゆみに効果を発揮します。