

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	バファリンEX
2	成分・分量	1錠中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg(無水物として 60mg) 乾燥水酸化アルミニウムゲル 120mg
3	用法・用量	成人(15歳以上)は、症状があらわれたとき、1回1錠をなるべく空腹時をさけて水またはお湯にて服用してください。通常1日2回まで。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上おいてください。
4	効能・効果	(1) 頭痛・腰痛・関節痛・月経痛(生理痛)・肩こり痛・神経痛・筋肉痛・骨折痛・ ねんざ痛・打撲痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・外傷痛の鎮痛 (2) 悪寒・発熱時の解熱
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 (3) 15歳未満の小児。 (4) 医療機関で次の治療を受けている人。 胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病、心臓病 (5) 医師から赤血球数が少ない(貧血)、血小板数が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)、白血球数が少ない等の血液異常(血液の病気)を指摘されている人。 (6) 出産予定日12週以内の妊婦。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 3. 服用前後は飲酒しないでください 4. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・授乳中の人。・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・気管支ぜんそく、潰瘍性大腸炎、クローン病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病の診断を受けた人。 ・胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病、血液の病気にかかったことのある人。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。