

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず使用上の注意を読んで下さい

1	名称	ボルタレン EX テープ
2	成分・分量	(膏体100g中) ジクロフェナクナトリウム 1g
3	用法・用量	プラスチックフィルムをはがし、1日1回1～2枚を患部に貼ってください。 ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
4	効能・効果	腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください。 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15才未満の小児 2. 次の部位には使用しないでください。 (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。 4. 連続して2週間以上使用しないでください。 次に該当する人はご相談ください。 ○医師の治療を受けている人 ○他の医薬品を使用している人 ○薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ○テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人 ○高齢者 ○消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザの診断を受けた人 ○ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤(アスピリン等)、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤の投与を受けている人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。