

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	チクナインb													
2	成分・分量	<p>1日量(8錠中) 辛夷清肺湯エキス…2.0g シンイ…1.5g チモ…1.5g ビャクドウ…1.5g オウゴン…1.5g サンシシ…0.75g バクモンドウ…3.0g セッコウ…3.0g ショウマ…0.75g ビワヨウ…0.5g より抽出 添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸AI、CMC—Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシテ ンプンを含有する</p> <p>●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります</p>													
3	用法・用量	<p>次の量を朝夕、食前または食間に水又はお湯で服用してください</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大人(15才以上)</td> <td>4錠</td> <td rowspan="3">1日2回</td> </tr> <tr> <td>7才以上15才未満</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td>5才以上7才未満</td> <td>2錠</td> </tr> <tr> <td>5才未満</td> <td>服用しないこと</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><用法・用量に関連する注意></p> <p>(1)定められた用法・用量を厳守すること (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます</p>	年齢	1回量	服用回数	大人(15才以上)	4錠	1日2回	7才以上15才未満	3錠	5才以上7才未満	2錠	5才未満	服用しないこと	
年齢	1回量	服用回数													
大人(15才以上)	4錠	1日2回													
7才以上15才未満	3錠														
5才以上7才未満	2錠														
5才未満	服用しないこと														
4	効能・効果	鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)													
5	保健衛生上の危 害を防止するた めに必要な事項	<p><相談すること></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること <ol style="list-style-type: none"> (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸虚弱で冷え症の人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消化器</td> <td>食欲不振、胃部不快感</td> </tr> </tbody> </table> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがある その場合は直ちに医師の診療を受けること</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>症状の名称</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>間質性肺炎</td> <td>階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなす、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする</td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td>発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる</td> </tr> <tr> <td>腸間膜静脈硬化症</td> <td>長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感等が繰り返しあらわれる</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 	関係部位	症状	消化器	食欲不振、胃部不快感	症状の名称	症状	間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなす、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする	肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる	腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感等が繰り返しあらわれる	
関係部位	症状														
消化器	食欲不振、胃部不快感														
症状の名称	症状														
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなす、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする														
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる														
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感等が繰り返しあらわれる														
6	薬剤師または登 録販売者が必要 と判断する事項														

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。