

医薬品を正しく購入するための 説 明 文 書


要指導医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	クラリチンEX
2	成分・分量	1錠中 ロラタジン 10mg
3	用法・用量	成人（15才以上）、1回1錠、1日1回食後に服用してください。 なお、毎回同じ時間帯に服用してください。
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和： 鼻みず、鼻づまり、くしゃみ
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください <ol style="list-style-type: none"> 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 15才未満の小児。 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を 含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等）、 エリスロマイシン、シメチジン 服用前後は飲酒しないでください 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて ください 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人。 次の診断を受けた人。 肝臓病、腎臓病、てんかん アレルギー性鼻炎か、かぜなど他の原因によるものかわからない人。 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎などの他のアレルギー疾患の診断を受けたこと がある人。 妊婦又は妊娠していると思われる人。 高齢者。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。



〔実物大〕

包装	14 錠
	7 錠

〈商品特長〉

- ◆クラーリチン EX は花粉・ハウスダストなどによる鼻みず・鼻づまり・くしゃみにしっかり効く、アレルギー専用の鼻炎薬です。
- ◆眠くなりにくい第2世代抗ヒスタミン薬「ロラタジン」を、医療用と同じ 10mg（1 日量）配合しました。
- ◆1 日 1 回 1 錠で長く効くので、飲み忘れしにくく、利便性の高い製品です。