

周術期管理チームテキスト 第5版 正誤表

下記の通り、誤記がありましたので訂正いたします。

NO	訂正日	正誤箇所	誤	正																																
1	2026年3月2日	P431表2 血液製剤の種類と特徴	<p>赤血球液の保存可能期間 21日</p> <p style="text-align: center;"><b>表2 血液製剤の種類と特徴</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>赤血球液</th> <th>新鮮凍結血漿</th> <th>血小板濃厚液</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保存可能期間</td> <td>採血後冷蔵保存で21日</td> <td>採血後冷凍保存で12か月。 融解後は直ちに使用。2～6℃保存で24時間以内</td> <td>採血後4日以内 20～24℃で振盪する</td> </tr> <tr> <td>製剤の特徴</td> <td colspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> <li>わが国の製剤は採血時に白血球除去されている</li> <li>GVHD予防のための放射線照射済みの製剤が利用可能である</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>投与基準</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>輸血のトリガー値（Hb濃度）を7g/dLとすることを推奨</li> <li>9g/dL以上では輸血しないことを強く推奨</li> <li>周術期貧血のトリガー値をHb値7～8g/dLとすることを強く推奨</li> <li>心疾患を有する患者の手術では8～10g/dL、人工心臓使用手術後の貧血では9～10g/dLとすることを推奨</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>凝固因子の補充に関してのトリガーとなる検査値                             <ul style="list-style-type: none"> <li>PT</li> <li>INR 2.0以上、または30%以下</li> <li>APTT</li> </ul> </li> <li>各医療機関における基準の上限は2倍以上、または25%以下</li> <li>フィブリノゲン 150mg/dL以下、またはこれ以下に進展する危険性がある場合</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>周術期は5万以上を維持するよう輸血することを推奨</li> <li>長時間人工心臓や低体温人工心臓を用いた手術では5～10万になるよう輸血を行い、臨床的に血小板機能異常が疑われる場合には10万以上にすることも考慮</li> <li>局所での止血困難な領域の手術（顕蓋内など）では10万以上が望ましい</li> <li>中心静脈カテーテル挿入時には2万以上を目指して輸血することを推奨</li> <li>腰椎穿刺では5万以上とすることを推奨</li> <li>産科危機的出血や外傷性出血性ショックの患者では凝固因子の著しい消費に伴う止血困難がしばしば伴うため、新鮮凍結血漿や血小板濃厚液の早期投与による予後改善が期待される</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>		赤血球液	新鮮凍結血漿	血小板濃厚液	保存可能期間	採血後冷蔵保存で21日	採血後冷凍保存で12か月。 融解後は直ちに使用。2～6℃保存で24時間以内	採血後4日以内 20～24℃で振盪する	製剤の特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>わが国の製剤は採血時に白血球除去されている</li> <li>GVHD予防のための放射線照射済みの製剤が利用可能である</li> </ul>			投与基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>輸血のトリガー値（Hb濃度）を7g/dLとすることを推奨</li> <li>9g/dL以上では輸血しないことを強く推奨</li> <li>周術期貧血のトリガー値をHb値7～8g/dLとすることを強く推奨</li> <li>心疾患を有する患者の手術では8～10g/dL、人工心臓使用手術後の貧血では9～10g/dLとすることを推奨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>凝固因子の補充に関してのトリガーとなる検査値                             <ul style="list-style-type: none"> <li>PT</li> <li>INR 2.0以上、または30%以下</li> <li>APTT</li> </ul> </li> <li>各医療機関における基準の上限は2倍以上、または25%以下</li> <li>フィブリノゲン 150mg/dL以下、またはこれ以下に進展する危険性がある場合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>周術期は5万以上を維持するよう輸血することを推奨</li> <li>長時間人工心臓や低体温人工心臓を用いた手術では5～10万になるよう輸血を行い、臨床的に血小板機能異常が疑われる場合には10万以上にすることも考慮</li> <li>局所での止血困難な領域の手術（顕蓋内など）では10万以上が望ましい</li> <li>中心静脈カテーテル挿入時には2万以上を目指して輸血することを推奨</li> <li>腰椎穿刺では5万以上とすることを推奨</li> <li>産科危機的出血や外傷性出血性ショックの患者では凝固因子の著しい消費に伴う止血困難がしばしば伴うため、新鮮凍結血漿や血小板濃厚液の早期投与による予後改善が期待される</li> </ul>	<p>赤血球液の保存可能期間 28日</p> <p style="text-align: center;"><b>表2 血液製剤の種類と特徴</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>赤血球液</th> <th>新鮮凍結血漿</th> <th>血小板濃厚液</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保存可能期間</td> <td>採血後冷蔵保存で28日</td> <td>採血後冷凍保存で12か月。 融解後は直ちに使用。2～6℃保存で24時間以内</td> <td>採血後4日以内 20～24℃で振盪する</td> </tr> <tr> <td>製剤の特徴</td> <td colspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> <li>わが国の製剤は採血時に白血球除去されている</li> <li>GVHD予防のための放射線照射済みの製剤が利用可能である</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>投与基準</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>輸血のトリガー値（Hb濃度）を7g/dLとすることを推奨</li> <li>9g/dL以上では輸血しないことを強く推奨</li> <li>周術期貧血のトリガー値をHb値7～8g/dLとすることを強く推奨</li> <li>心疾患を有する患者の手術では8～10g/dL、人工心臓使用手術後の貧血では9～10g/dLとすることを推奨</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>凝固因子の補充に関してのトリガーとなる検査値                             <ul style="list-style-type: none"> <li>PT</li> <li>INR 2.0以上、または30%以下</li> <li>APTT</li> </ul> </li> <li>各医療機関における基準の上限は2倍以上、または25%以下</li> <li>フィブリノゲン 150mg/dL以下、またはこれ以下に進展する危険性がある場合</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>周術期は5万以上を維持するよう輸血することを推奨</li> <li>長時間人工心臓や低体温人工心臓を用いた手術では5～10万になるよう輸血を行い、臨床的に血小板機能異常が疑われる場合には10万以上にすることも考慮</li> <li>局所での止血困難な領域の手術（顕蓋内など）では10万以上が望ましい</li> <li>中心静脈カテーテル挿入時には2万以上を目指して輸血することを推奨</li> <li>腰椎穿刺では5万以上とすることを推奨</li> <li>産科危機的出血や外傷性出血性ショックの患者では凝固因子の著しい消費に伴う止血困難がしばしば伴うため、新鮮凍結血漿や血小板濃厚液の早期投与による予後改善が期待される</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>		赤血球液	新鮮凍結血漿	血小板濃厚液	保存可能期間	採血後冷蔵保存で28日	採血後冷凍保存で12か月。 融解後は直ちに使用。2～6℃保存で24時間以内	採血後4日以内 20～24℃で振盪する	製剤の特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>わが国の製剤は採血時に白血球除去されている</li> <li>GVHD予防のための放射線照射済みの製剤が利用可能である</li> </ul>			投与基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>輸血のトリガー値（Hb濃度）を7g/dLとすることを推奨</li> <li>9g/dL以上では輸血しないことを強く推奨</li> <li>周術期貧血のトリガー値をHb値7～8g/dLとすることを強く推奨</li> <li>心疾患を有する患者の手術では8～10g/dL、人工心臓使用手術後の貧血では9～10g/dLとすることを推奨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>凝固因子の補充に関してのトリガーとなる検査値                             <ul style="list-style-type: none"> <li>PT</li> <li>INR 2.0以上、または30%以下</li> <li>APTT</li> </ul> </li> <li>各医療機関における基準の上限は2倍以上、または25%以下</li> <li>フィブリノゲン 150mg/dL以下、またはこれ以下に進展する危険性がある場合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>周術期は5万以上を維持するよう輸血することを推奨</li> <li>長時間人工心臓や低体温人工心臓を用いた手術では5～10万になるよう輸血を行い、臨床的に血小板機能異常が疑われる場合には10万以上にすることも考慮</li> <li>局所での止血困難な領域の手術（顕蓋内など）では10万以上が望ましい</li> <li>中心静脈カテーテル挿入時には2万以上を目指して輸血することを推奨</li> <li>腰椎穿刺では5万以上とすることを推奨</li> <li>産科危機的出血や外傷性出血性ショックの患者では凝固因子の著しい消費に伴う止血困難がしばしば伴うため、新鮮凍結血漿や血小板濃厚液の早期投与による予後改善が期待される</li> </ul>
	赤血球液	新鮮凍結血漿	血小板濃厚液																																	
保存可能期間	採血後冷蔵保存で21日	採血後冷凍保存で12か月。 融解後は直ちに使用。2～6℃保存で24時間以内	採血後4日以内 20～24℃で振盪する																																	
製剤の特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>わが国の製剤は採血時に白血球除去されている</li> <li>GVHD予防のための放射線照射済みの製剤が利用可能である</li> </ul>																																			
投与基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>輸血のトリガー値（Hb濃度）を7g/dLとすることを推奨</li> <li>9g/dL以上では輸血しないことを強く推奨</li> <li>周術期貧血のトリガー値をHb値7～8g/dLとすることを強く推奨</li> <li>心疾患を有する患者の手術では8～10g/dL、人工心臓使用手術後の貧血では9～10g/dLとすることを推奨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>凝固因子の補充に関してのトリガーとなる検査値                             <ul style="list-style-type: none"> <li>PT</li> <li>INR 2.0以上、または30%以下</li> <li>APTT</li> </ul> </li> <li>各医療機関における基準の上限は2倍以上、または25%以下</li> <li>フィブリノゲン 150mg/dL以下、またはこれ以下に進展する危険性がある場合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>周術期は5万以上を維持するよう輸血することを推奨</li> <li>長時間人工心臓や低体温人工心臓を用いた手術では5～10万になるよう輸血を行い、臨床的に血小板機能異常が疑われる場合には10万以上にすることも考慮</li> <li>局所での止血困難な領域の手術（顕蓋内など）では10万以上が望ましい</li> <li>中心静脈カテーテル挿入時には2万以上を目指して輸血することを推奨</li> <li>腰椎穿刺では5万以上とすることを推奨</li> <li>産科危機的出血や外傷性出血性ショックの患者では凝固因子の著しい消費に伴う止血困難がしばしば伴うため、新鮮凍結血漿や血小板濃厚液の早期投与による予後改善が期待される</li> </ul>																																	
	赤血球液	新鮮凍結血漿	血小板濃厚液																																	
保存可能期間	採血後冷蔵保存で28日	採血後冷凍保存で12か月。 融解後は直ちに使用。2～6℃保存で24時間以内	採血後4日以内 20～24℃で振盪する																																	
製剤の特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>わが国の製剤は採血時に白血球除去されている</li> <li>GVHD予防のための放射線照射済みの製剤が利用可能である</li> </ul>																																			
投与基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>輸血のトリガー値（Hb濃度）を7g/dLとすることを推奨</li> <li>9g/dL以上では輸血しないことを強く推奨</li> <li>周術期貧血のトリガー値をHb値7～8g/dLとすることを強く推奨</li> <li>心疾患を有する患者の手術では8～10g/dL、人工心臓使用手術後の貧血では9～10g/dLとすることを推奨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>凝固因子の補充に関してのトリガーとなる検査値                             <ul style="list-style-type: none"> <li>PT</li> <li>INR 2.0以上、または30%以下</li> <li>APTT</li> </ul> </li> <li>各医療機関における基準の上限は2倍以上、または25%以下</li> <li>フィブリノゲン 150mg/dL以下、またはこれ以下に進展する危険性がある場合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>周術期は5万以上を維持するよう輸血することを推奨</li> <li>長時間人工心臓や低体温人工心臓を用いた手術では5～10万になるよう輸血を行い、臨床的に血小板機能異常が疑われる場合には10万以上にすることも考慮</li> <li>局所での止血困難な領域の手術（顕蓋内など）では10万以上が望ましい</li> <li>中心静脈カテーテル挿入時には2万以上を目指して輸血することを推奨</li> <li>腰椎穿刺では5万以上とすることを推奨</li> <li>産科危機的出血や外傷性出血性ショックの患者では凝固因子の著しい消費に伴う止血困難がしばしば伴うため、新鮮凍結血漿や血小板濃厚液の早期投与による予後改善が期待される</li> </ul>																																	
2	2026年3月2日	P555 表3 アナフィラキシーの判断基準	<p style="text-align: center;"><b>表3 アナフィラキシーの診断基準</b></p> <p>以下の(A)～(C)の3項目のうち、いずれかに該当すればアナフィラキシーと診断する。</p> <p>(A) ①に少なくとも②、③の1つを伴う (B) ①～④の症状のうち2つ以上伴う (C) アレルゲン曝露後の急速な血圧低下</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>症状（経過は数分～数時間以内で急速である）             <ul style="list-style-type: none"> <li>①皮膚・粘膜症状：全身の発疹、痒疹、紅潮、口唇・舌・口蓋垂の腫脹など</li> <li>②呼吸器症状：呼吸困難、気道狭窄、喘鳴、低酸素血症など</li> <li>③循環器症状：血圧低下、意識障害</li> <li>④持続する消化器症状：腹部痙攣、嘔吐</li> </ul> </li> </ul> <p>[日本アレルギー学会 Anaphylaxis 対策特別委員会、アナフィラキシーガイドライン、2014より改変]<sup>11)</sup></p>	<p style="text-align: center;"><b>表3 アナフィラキシーの診断基準</b></p> <p>以下の2つの基準のいずれかを満たす場合、アナフィラキシーである可能性が非常に高い。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>皮膚、粘膜、またはその両方の症状（全身性の蕁麻疹、掻痒または紅潮、口唇・舌・口蓋垂の腫脹など）が急速に（数分～数時間で）発症した場合。さらに、少なくとも以下A-Cの1つを伴う。             <ol style="list-style-type: none"> <li>気道/呼吸：重度の呼吸器症状（呼吸困難、呼吸性喘鳴・気管支痙攣、吸気性喘鳴、最大呼気流量低下、低酸素血症など）</li> <li>循環器：血圧低下又は臓器不全に伴う症状（筋緊張低下[虚脱]、失神、失禁など）</li> <li>その他：重度の消化器症状（重度の痙攣性腹痛、反射性嘔吐など [特に食物以外のアレルゲンへの曝露後]</li> </ol> </li> <li>典型的な皮膚症状を作わなくても、当該患者にとって既知のアレルゲン又はアレルゲンの可能性が極めて高いものに曝露された後、血圧低下*または気管支痙攣または喉頭症状**が急速に（数分～数時間で）発症した場合。             <ol style="list-style-type: none"> <li>乳児・小児：収縮期血圧が低い（年齢別の値との比較）、または30%を超える収縮期血圧の低下*または気管支痙攣・喉頭症状**。</li> <li>成人：収縮期血圧が90mmHg未満、または本人のベースライン値に比べて30%を超える収縮期血圧の低下または気管支痙攣・喉頭症状**。</li> </ol> </li> </ol> <p>*血圧低下は、本人のベースライン値に比べて30%を超える収縮期血圧の低下がみられる場合、または以下の場合と定義する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>乳児及び10歳以下の小児：収縮期血圧が(70+[2×年齢(歳)])mmHg未満</li> <li>成人：収縮期血圧が90mmHg未満</li> </ol> <p>**喉頭症状：吸気性喘鳴、編成、嚥下痛など。</p> <p>[日本アレルギー学会 Anaphylaxis 対策特別委員会、アナフィラキシーガイドライン、2022より改変]</p>																																

周術期管理チームテキスト 第5版 正誤表

下記の通り、誤記がありましたので訂正いたします。

NO	訂正日	正誤箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	2026年3月2日	P443 表2 術前中止薬と休業期間一覧	<p>表2 術前中止薬と休業期間一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手術時の出血リスクが高まる薬剤</th> <th>区分</th> <th>一般名</th> <th>商品名</th> <th>休業期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">抗血小板薬</td> <td rowspan="2">アスピリン</td> <td>バファリン</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>チカロピジン</td> <td>10～14日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">チカロピジン</td> <td>パナルジン</td> <td>3日</td> </tr> <tr> <td>クロピドグレル</td> <td>ブラスグレル</td> <td>5日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ブラスグレル</td> <td>エフィエント</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>シロスタゾール</td> <td>プレタール</td> <td>3日</td> </tr> <tr> <td>ワルファリン</td> <td>ワルファリン</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>エタナセプト酸</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>イコサペント酸</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>オキサベント酸エチル</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">抗凝固薬</td> <td>ワルファリン</td> <td>ワルファリン</td> <td>3～5日</td> </tr> <tr> <td>ジビダモール</td> <td>ジビダモール</td> <td>24時間以上</td> </tr> <tr> <td>リバーロキサゲン</td> <td>イグザラート</td> <td>24時間以上</td> </tr> <tr> <td>アピキサラン</td> <td>エリキヤブ</td> <td>24時間以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高凝固薬</td> <td>オメガ-3脂肪酸エチル</td> <td>オメガ-3脂肪酸エチル</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>リマプロストアルファテクス</td> <td>オバルモン</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">冠血管拡張薬</td> <td>ジビダモール</td> <td>ジビダモール</td> <td>1～2日</td> </tr> <tr> <td>ジラゼブ</td> <td>コメリアン</td> <td>2～3日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鎮痛薬・代謝改善薬</td> <td>イブプロフェン</td> <td>ケクス</td> <td>休業不要</td> </tr> <tr> <td>エタナセプト酸</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>1～2日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">手術時の血栓症のリスクが高まる薬剤</td> <td>コロキシン</td> <td>エビスタ</td> <td>3日</td> </tr> <tr> <td>ホルモン製剤</td> <td>プログステロン</td> <td>術後1週以内は禁投 術後1か月以内は慎重投与</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">抗血小板作用を有する薬剤</td> <td>アスピリン</td> <td>アスピリン</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>チカロピジン</td> <td>チカロピジン</td> <td>10～14日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">抗凝固薬</td> <td>ワルファリン</td> <td>ワルファリン</td> <td>3～5日</td> </tr> <tr> <td>ジビダモール</td> <td>ジビダモール</td> <td>24時間以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高凝固薬</td> <td>オメガ-3脂肪酸エチル</td> <td>オメガ-3脂肪酸エチル</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>リマプロストアルファテクス</td> <td>オバルモン</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">冠血管拡張薬</td> <td>ジビダモール</td> <td>ジビダモール</td> <td>1～2日</td> </tr> <tr> <td>ジラゼブ</td> <td>コメリアン</td> <td>2～3日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鎮痛薬・代謝改善薬</td> <td>イブプロフェン</td> <td>ケクス</td> <td>休業不要</td> </tr> <tr> <td>エタナセプト酸</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>1～2日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">手術時の血栓症のリスクが高まる薬剤</td> <td>コロキシン</td> <td>エビスタ</td> <td>3日</td> </tr> <tr> <td>ホルモン製剤</td> <td>プログステロン</td> <td>術後1週以内は禁投 術後1か月以内は慎重投与</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">抗血小板作用を有する薬剤</td> <td>アスピリン</td> <td>アスピリン</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>チカロピジン</td> <td>チカロピジン</td> <td>10～14日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">抗凝固薬</td> <td>ワルファリン</td> <td>ワルファリン</td> <td>3～5日</td> </tr> <tr> <td>ジビダモール</td> <td>ジビダモール</td> <td>24時間以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高凝固薬</td> <td>オメガ-3脂肪酸エチル</td> <td>オメガ-3脂肪酸エチル</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>リマプロストアルファテクス</td> <td>オバルモン</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">冠血管拡張薬</td> <td>ジビダモール</td> <td>ジビダモール</td> <td>1～2日</td> </tr> <tr> <td>ジラゼブ</td> <td>コメリアン</td> <td>2～3日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鎮痛薬・代謝改善薬</td> <td>イブプロフェン</td> <td>ケクス</td> <td>休業不要</td> </tr> <tr> <td>エタナセプト酸</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>1～2日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">手術時の血栓症のリスクが高まる薬剤</td> <td>コロキシン</td> <td>エビスタ</td> <td>3日</td> </tr> <tr> <td>ホルモン製剤</td> <td>プログステロン</td> <td>術後1週以内は禁投 術後1か月以内は慎重投与</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">抗血小板作用を有する薬剤</td> <td>アスピリン</td> <td>アスピリン</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>チカロピジン</td> <td>チカロピジン</td> <td>10～14日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">抗凝固薬</td> <td>ワルファリン</td> <td>ワルファリン</td> <td>3～5日</td> </tr> <tr> <td>ジビダモール</td> <td>ジビダモール</td> <td>24時間以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高凝固薬</td> <td>オメガ-3脂肪酸エチル</td> <td>オメガ-3脂肪酸エチル</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>リマプロストアルファテクス</td> <td>オバルモン</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">冠血管拡張薬</td> <td>ジビダモール</td> <td>ジビダモール</td> <td>1～2日</td> </tr> <tr> <td>ジラゼブ</td> <td>コメリアン</td> <td>2～3日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鎮痛薬・代謝改善薬</td> <td>イブプロフェン</td> <td>ケクス</td> <td>休業不要</td> </tr> <tr> <td>エタナセプト酸</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>1～2日</td> </tr> </tbody> </table>	手術時の出血リスクが高まる薬剤	区分	一般名	商品名	休業期間	抗血小板薬	アスピリン	バファリン	7日	チカロピジン	10～14日	チカロピジン	パナルジン	3日	クロピドグレル	ブラスグレル	5日	ブラスグレル	エフィエント	7日	シロスタゾール	プレタール	3日	ワルファリン	ワルファリン	1日	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1日	イコサペント酸	エタナセプト酸	1日	オキサベント酸エチル	エタナセプト酸	7日	抗凝固薬	ワルファリン	ワルファリン	3～5日	ジビダモール	ジビダモール	24時間以上	リバーロキサゲン	イグザラート	24時間以上	アピキサラン	エリキヤブ	24時間以上	高凝固薬	オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル	7日	リマプロストアルファテクス	オバルモン	1日	冠血管拡張薬	ジビダモール	ジビダモール	1～2日	ジラゼブ	コメリアン	2～3日	鎮痛薬・代謝改善薬	イブプロフェン	ケクス	休業不要	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1～2日	手術時の血栓症のリスクが高まる薬剤	コロキシン	エビスタ	3日	ホルモン製剤	プログステロン	術後1週以内は禁投 術後1か月以内は慎重投与	抗血小板作用を有する薬剤	アスピリン	アスピリン	7日	チカロピジン	チカロピジン	10～14日	抗凝固薬	ワルファリン	ワルファリン	3～5日	ジビダモール	ジビダモール	24時間以上	高凝固薬	オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル	7日	リマプロストアルファテクス	オバルモン	1日	冠血管拡張薬	ジビダモール	ジビダモール	1～2日	ジラゼブ	コメリアン	2～3日	鎮痛薬・代謝改善薬	イブプロフェン	ケクス	休業不要	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1～2日	手術時の血栓症のリスクが高まる薬剤	コロキシン	エビスタ	3日	ホルモン製剤	プログステロン	術後1週以内は禁投 術後1か月以内は慎重投与	抗血小板作用を有する薬剤	アスピリン	アスピリン	7日	チカロピジン	チカロピジン	10～14日	抗凝固薬	ワルファリン	ワルファリン	3～5日	ジビダモール	ジビダモール	24時間以上	高凝固薬	オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル	7日	リマプロストアルファテクス	オバルモン	1日	冠血管拡張薬	ジビダモール	ジビダモール	1～2日	ジラゼブ	コメリアン	2～3日	鎮痛薬・代謝改善薬	イブプロフェン	ケクス	休業不要	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1～2日	手術時の血栓症のリスクが高まる薬剤	コロキシン	エビスタ	3日	ホルモン製剤	プログステロン	術後1週以内は禁投 術後1か月以内は慎重投与	抗血小板作用を有する薬剤	アスピリン	アスピリン	7日	チカロピジン	チカロピジン	10～14日	抗凝固薬	ワルファリン	ワルファリン	3～5日	ジビダモール	ジビダモール	24時間以上	高凝固薬	オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル	7日	リマプロストアルファテクス	オバルモン	1日	冠血管拡張薬	ジビダモール	ジビダモール	1～2日	ジラゼブ	コメリアン	2～3日	鎮痛薬・代謝改善薬	イブプロフェン	ケクス	休業不要	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1～2日	<p>表2 術前中止薬と休業期間一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手術時の出血リスクが高まる薬剤</th> <th>区分</th> <th>一般名</th> <th>商品名</th> <th>休業期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">抗血小板薬</td> <td rowspan="2">アスピリン</td> <td>バファリン</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>チカロピジン</td> <td>パナルジン</td> <td>10～14日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">チカロピジン</td> <td>パナルジン</td> <td>3日</td> </tr> <tr> <td>クロピドグレル</td> <td>ブラスグレル</td> <td>5日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ブラスグレル</td> <td>エフィエント</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>シロスタゾール</td> <td>プレタール</td> <td>3日</td> </tr> <tr> <td>ワルファリン</td> <td>ワルファリン</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>エタナセプト酸</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>イコサペント酸</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>オキサベント酸エチル</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">抗凝固薬</td> <td>ワルファリン</td> <td>ワルファリン</td> <td>3～5日</td> </tr> <tr> <td>ジビダモール</td> <td>ジビダモール</td> <td>24時間以上</td> </tr> <tr> <td>リバーロキサゲン</td> <td>イグザラート</td> <td>24時間以上</td> </tr> <tr> <td>アピキサラン</td> <td>エリキヤブ</td> <td>24時間以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高凝固薬</td> <td>オメガ-3脂肪酸エチル</td> <td>オメガ-3脂肪酸エチル</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>リマプロストアルファテクス</td> <td>オバルモン</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">冠血管拡張薬</td> <td>ジビダモール</td> <td>ジビダモール</td> <td>1～2日</td> </tr> <tr> <td>ジラゼブ</td> <td>コメリアン</td> <td>2～3日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鎮痛薬・代謝改善薬</td> <td>イブプロフェン</td> <td>ケクス</td> <td>休業不要</td> </tr> <tr> <td>エタナセプト酸</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>1～2日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">手術時の血栓症のリスクが高まる薬剤</td> <td>コロキシン</td> <td>エビスタ</td> <td>3日</td> </tr> <tr> <td>ホルモン製剤</td> <td>プログステロン</td> <td>術後1週以内は禁投 術後1か月以内は慎重投与</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">抗血小板作用を有する薬剤</td> <td>アスピリン</td> <td>アスピリン</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>チカロピジン</td> <td>チカロピジン</td> <td>10～14日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">抗凝固薬</td> <td>ワルファリン</td> <td>ワルファリン</td> <td>3～5日</td> </tr> <tr> <td>ジビダモール</td> <td>ジビダモール</td> <td>24時間以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高凝固薬</td> <td>オメガ-3脂肪酸エチル</td> <td>オメガ-3脂肪酸エチル</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>リマプロストアルファテクス</td> <td>オバルモン</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">冠血管拡張薬</td> <td>ジビダモール</td> <td>ジビダモール</td> <td>1～2日</td> </tr> <tr> <td>ジラゼブ</td> <td>コメリアン</td> <td>2～3日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鎮痛薬・代謝改善薬</td> <td>イブプロフェン</td> <td>ケクス</td> <td>休業不要</td> </tr> <tr> <td>エタナセプト酸</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>1～2日</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：施設により対応の違いがある薬物も含まれる</p>	手術時の出血リスクが高まる薬剤	区分	一般名	商品名	休業期間	抗血小板薬	アスピリン	バファリン	7日	チカロピジン	パナルジン	10～14日	チカロピジン	パナルジン	3日	クロピドグレル	ブラスグレル	5日	ブラスグレル	エフィエント	7日	シロスタゾール	プレタール	3日	ワルファリン	ワルファリン	1日	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1日	イコサペント酸	エタナセプト酸	1日	オキサベント酸エチル	エタナセプト酸	7日	抗凝固薬	ワルファリン	ワルファリン	3～5日	ジビダモール	ジビダモール	24時間以上	リバーロキサゲン	イグザラート	24時間以上	アピキサラン	エリキヤブ	24時間以上	高凝固薬	オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル	7日	リマプロストアルファテクス	オバルモン	1日	冠血管拡張薬	ジビダモール	ジビダモール	1～2日	ジラゼブ	コメリアン	2～3日	鎮痛薬・代謝改善薬	イブプロフェン	ケクス	休業不要	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1～2日	手術時の血栓症のリスクが高まる薬剤	コロキシン	エビスタ	3日	ホルモン製剤	プログステロン	術後1週以内は禁投 術後1か月以内は慎重投与	抗血小板作用を有する薬剤	アスピリン	アスピリン	7日	チカロピジン	チカロピジン	10～14日	抗凝固薬	ワルファリン	ワルファリン	3～5日	ジビダモール	ジビダモール	24時間以上	高凝固薬	オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル	7日	リマプロストアルファテクス	オバルモン	1日	冠血管拡張薬	ジビダモール	ジビダモール	1～2日	ジラゼブ	コメリアン	2～3日	鎮痛薬・代謝改善薬	イブプロフェン	ケクス	休業不要	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1～2日
手術時の出血リスクが高まる薬剤	区分	一般名	商品名	休業期間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
抗血小板薬	アスピリン	バファリン	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		チカロピジン	10～14日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	チカロピジン	パナルジン	3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		クロピドグレル	ブラスグレル	5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	ブラスグレル	エフィエント	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		シロスタゾール	プレタール	3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	ワルファリン	ワルファリン	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	イコサペント酸	エタナセプト酸	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	オキサベント酸エチル	エタナセプト酸	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
抗凝固薬	ワルファリン	ワルファリン	3～5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ジビダモール	ジビダモール	24時間以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	リバーロキサゲン	イグザラート	24時間以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	アピキサラン	エリキヤブ	24時間以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
高凝固薬	オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	リマプロストアルファテクス	オバルモン	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
冠血管拡張薬	ジビダモール	ジビダモール	1～2日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ジラゼブ	コメリアン	2～3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
鎮痛薬・代謝改善薬	イブプロフェン	ケクス	休業不要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1～2日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
手術時の血栓症のリスクが高まる薬剤	コロキシン	エビスタ	3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ホルモン製剤	プログステロン	術後1週以内は禁投 術後1か月以内は慎重投与																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
抗血小板作用を有する薬剤	アスピリン	アスピリン	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	チカロピジン	チカロピジン	10～14日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
抗凝固薬	ワルファリン	ワルファリン	3～5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ジビダモール	ジビダモール	24時間以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
高凝固薬	オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	リマプロストアルファテクス	オバルモン	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
冠血管拡張薬	ジビダモール	ジビダモール	1～2日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ジラゼブ	コメリアン	2～3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
鎮痛薬・代謝改善薬	イブプロフェン	ケクス	休業不要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1～2日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
手術時の血栓症のリスクが高まる薬剤	コロキシン	エビスタ	3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ホルモン製剤	プログステロン	術後1週以内は禁投 術後1か月以内は慎重投与																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
抗血小板作用を有する薬剤	アスピリン	アスピリン	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	チカロピジン	チカロピジン	10～14日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
抗凝固薬	ワルファリン	ワルファリン	3～5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ジビダモール	ジビダモール	24時間以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
高凝固薬	オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	リマプロストアルファテクス	オバルモン	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
冠血管拡張薬	ジビダモール	ジビダモール	1～2日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ジラゼブ	コメリアン	2～3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
鎮痛薬・代謝改善薬	イブプロフェン	ケクス	休業不要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1～2日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
手術時の血栓症のリスクが高まる薬剤	コロキシン	エビスタ	3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ホルモン製剤	プログステロン	術後1週以内は禁投 術後1か月以内は慎重投与																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
抗血小板作用を有する薬剤	アスピリン	アスピリン	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	チカロピジン	チカロピジン	10～14日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
抗凝固薬	ワルファリン	ワルファリン	3～5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ジビダモール	ジビダモール	24時間以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
高凝固薬	オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	リマプロストアルファテクス	オバルモン	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
冠血管拡張薬	ジビダモール	ジビダモール	1～2日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ジラゼブ	コメリアン	2～3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
鎮痛薬・代謝改善薬	イブプロフェン	ケクス	休業不要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1～2日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
手術時の出血リスクが高まる薬剤	区分	一般名	商品名	休業期間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
抗血小板薬	アスピリン	バファリン	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		チカロピジン	パナルジン	10～14日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	チカロピジン	パナルジン	3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		クロピドグレル	ブラスグレル	5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	ブラスグレル	エフィエント	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		シロスタゾール	プレタール	3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	ワルファリン	ワルファリン	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	イコサペント酸	エタナセプト酸	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	オキサベント酸エチル	エタナセプト酸	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
抗凝固薬	ワルファリン	ワルファリン	3～5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ジビダモール	ジビダモール	24時間以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	リバーロキサゲン	イグザラート	24時間以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	アピキサラン	エリキヤブ	24時間以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
高凝固薬	オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	リマプロストアルファテクス	オバルモン	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
冠血管拡張薬	ジビダモール	ジビダモール	1～2日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ジラゼブ	コメリアン	2～3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
鎮痛薬・代謝改善薬	イブプロフェン	ケクス	休業不要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1～2日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
手術時の血栓症のリスクが高まる薬剤	コロキシン	エビスタ	3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ホルモン製剤	プログステロン	術後1週以内は禁投 術後1か月以内は慎重投与																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
抗血小板作用を有する薬剤	アスピリン	アスピリン	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	チカロピジン	チカロピジン	10～14日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
抗凝固薬	ワルファリン	ワルファリン	3～5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ジビダモール	ジビダモール	24時間以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
高凝固薬	オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル	7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	リマプロストアルファテクス	オバルモン	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
冠血管拡張薬	ジビダモール	ジビダモール	1～2日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ジラゼブ	コメリアン	2～3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
鎮痛薬・代謝改善薬	イブプロフェン	ケクス	休業不要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エタナセプト酸	エタナセプト酸	1～2日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	2026年3月2日	P462 表2 抗血小板作用を有する主な経口薬	<p>表2 抗血小板作用を有する主な経口薬</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>① 抗血小板薬</th> <th>一般名</th> <th>商品名</th> <th>作用機序</th> <th>作用の可逆性</th> <th>半減期</th> <th>一般的な術前休止期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">アスピリン (アセチルサリチル酸)</td> <td>アスピリン</td> <td>バファリン</td> <td>COX阻害</td> <td>不可逆的</td> <td>0.4時間</td> <td>5～7日</td> </tr> <tr> <td>チカロピジン</td> <td>パナルジン</td> <td>ADP受容体拮抗</td> <td>不可逆的</td> <td>1.6時間</td> <td>7～10日</td> </tr> <tr> <td>クロピドグレル</td> <td>ブラスグレル</td> <td>ADP受容体拮抗</td> <td>不可逆的</td> <td>7時間</td> <td>7～10日</td> </tr> <tr> <td>ブラスグレル</td> <td>エフィエント</td> <td>ADP受容体拮抗</td> <td>不可逆的</td> <td>1～5時間</td> <td>7～10日</td> </tr> <tr> <td>チカグレゾール</td> <td>プリリント</td> <td>ADP受容体拮抗</td> <td>可逆的</td> <td>0.5～4時間</td> <td>3～5日</td> </tr> <tr> <td>シロスタゾール</td> <td>プレタール</td> <td>PDE阻害</td> <td>可逆的</td> <td>18時間</td> <td>2～3日</td> </tr> <tr> <td>ジビダモール</td> <td>ベルサンチン、ジビダモールJG</td> <td>PDE阻害、TXA<sub>2</sub>合成抑制</td> <td>可逆的</td> <td>0.5時間</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">② 抗血小板作用を有する薬剤</td> <td>サルボグレレート</td> <td>アンブラーグ</td> <td>5-HT<sub>2</sub>阻害</td> <td>可逆的</td> <td>0.7時間</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>イコサペント酸</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>TXA<sub>2</sub>合成抑制</td> <td>不可逆的</td> <td>28時間</td> <td>7～10日</td> </tr> <tr> <td>ペラプロスト</td> <td>ドルナー</td> <td>PGI<sub>2</sub>誘導体</td> <td>可逆的</td> <td>1.1時間</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>トラビジル</td> <td>ロコルナール、エステリノール</td> <td>TXA<sub>2</sub>合成阻害</td> <td>可逆的</td> <td>6時間</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>ジラゼブ</td> <td>コメリアン</td> <td>TXA<sub>2</sub>合成阻害</td> <td>可逆的</td> <td>4時間</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>リマプロストアルファテクス</td> <td>オバルモン</td> <td>PGE<sub>1</sub>誘導体</td> <td>可逆的</td> <td>0.5時間</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>オザグレレ</td> <td>ベガ、ドメナン</td> <td>TXA<sub>2</sub>合成阻害</td> <td>可逆的</td> <td>1.5時間</td> <td>1日</td> </tr> </tbody> </table> <p>COX：シクロオキシゲナーゼ、ADP：アデノシン二リン酸、PDE：ホスホジエステラーゼ、TXA<sub>2</sub>：トロンボキサンA<sub>2</sub>、5-HT<sub>2</sub>：セロトニン受容体、PGI<sub>2</sub>：プロスタグランジンI<sub>2</sub>、PGE<sub>1</sub>：プロスタグランジンE<sub>1</sub>、</p> <p>注：添付文書に抗血小板薬と明記されているもののみを抗血小板薬として分類。</p>	① 抗血小板薬	一般名	商品名	作用機序	作用の可逆性	半減期	一般的な術前休止期間	アスピリン (アセチルサリチル酸)	アスピリン	バファリン	COX阻害	不可逆的	0.4時間	5～7日	チカロピジン	パナルジン	ADP受容体拮抗	不可逆的	1.6時間	7～10日	クロピドグレル	ブラスグレル	ADP受容体拮抗	不可逆的	7時間	7～10日	ブラスグレル	エフィエント	ADP受容体拮抗	不可逆的	1～5時間	7～10日	チカグレゾール	プリリント	ADP受容体拮抗	可逆的	0.5～4時間	3～5日	シロスタゾール	プレタール	PDE阻害	可逆的	18時間	2～3日	ジビダモール	ベルサンチン、ジビダモールJG	PDE阻害、TXA <sub>2</sub> 合成抑制	可逆的	0.5時間	1日	② 抗血小板作用を有する薬剤	サルボグレレート	アンブラーグ	5-HT <sub>2</sub> 阻害	可逆的	0.7時間	1日	イコサペント酸	エタナセプト酸	TXA <sub>2</sub> 合成抑制	不可逆的	28時間	7～10日	ペラプロスト	ドルナー	PGI <sub>2</sub> 誘導体	可逆的	1.1時間	1日	トラビジル	ロコルナール、エステリノール	TXA <sub>2</sub> 合成阻害	可逆的	6時間	1日	ジラゼブ	コメリアン	TXA <sub>2</sub> 合成阻害	可逆的	4時間	1日	リマプロストアルファテクス	オバルモン	PGE <sub>1</sub> 誘導体	可逆的	0.5時間	1日	オザグレレ	ベガ、ドメナン	TXA <sub>2</sub> 合成阻害	可逆的	1.5時間	1日	<p>表2 抗血小板作用を有する主な経口薬</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>① 抗血小板薬</th> <th>一般名</th> <th>商品名</th> <th>作用機序</th> <th>作用の可逆性</th> <th>半減期</th> <th>一般的な術前休止期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">アスピリン (アセチルサリチル酸)</td> <td>アスピリン</td> <td>バファリン</td> <td>COX阻害</td> <td>不可逆的</td> <td>0.4時間</td> <td>5～7日</td> </tr> <tr> <td>チカロピジン</td> <td>パナルジン</td> <td>ADP受容体拮抗</td> <td>不可逆的</td> <td>1.6時間</td> <td>7～10日</td> </tr> <tr> <td>クロピドグレル</td> <td>ブラスグレル</td> <td>ADP受容体拮抗</td> <td>不可逆的</td> <td>7時間</td> <td>7～10日</td> </tr> <tr> <td>ブラスグレル</td> <td>エフィエント</td> <td>ADP受容体拮抗</td> <td>不可逆的</td> <td>1～5時間</td> <td>7～10日</td> </tr> <tr> <td>チカグレゾール</td> <td>プリリント</td> <td>ADP受容体拮抗</td> <td>可逆的</td> <td>0.5～4時間</td> <td>3～5日</td> </tr> <tr> <td>シロスタゾール</td> <td>プレタール</td> <td>PDE阻害</td> <td>可逆的</td> <td>18時間</td> <td>2～3日</td> </tr> <tr> <td>ジビダモール</td> <td>ベルサンチン、ジビダモールJG</td> <td>PDE阻害、TXA<sub>2</sub>合成抑制</td> <td>可逆的</td> <td>0.5時間</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">② 抗血小板作用を有する薬剤</td> <td>サルボグレレート</td> <td>アンブラーグ</td> <td>5-HT<sub>2</sub>阻害</td> <td>可逆的</td> <td>0.7時間</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>イコサペント酸</td> <td>エタナセプト酸</td> <td>TXA<sub>2</sub>合成抑制</td> <td>不可逆的</td> <td>28時間</td> <td>7～10日</td> </tr> <tr> <td>ペラプロスト</td> <td>ドルナー</td> <td>PGI<sub>2</sub>誘導体</td> <td>可逆的</td> <td>1.1時間</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>トラビジル</td> <td>ロコルナール、エステリノール</td> <td>TXA<sub>2</sub>合成阻害</td> <td>可逆的</td> <td>6時間</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>ジラゼブ</td> <td>コメリアン</td> <td>TXA<sub>2</sub>合成阻害</td> <td>可逆的</td> <td>4時間</td> <td>2～3日</td> </tr> <tr> <td>リマプロストアルファテクス</td> <td>オバルモン</td> <td>PGE<sub>1</sub>誘導体</td> <td>可逆的</td> <td>0.5時間</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>オザグレレ</td> <td>ベガ、ドメナン</td> <td>TXA<sub>2</sub>合成阻害</td> <td>可逆的</td> <td>1.5時間</td> <td>1日</td> </tr> </tbody> </table> <p>COX：シクロオキシゲナーゼ、ADP：アデノシン二リン酸、PDE：ホスホジエステラーゼ、TXA<sub>2</sub>：トロンボキサンA<sub>2</sub>、5-HT<sub>2</sub>：セロトニン受容体、PGI<sub>2</sub>：プロスタグランジンI<sub>2</sub>、PGE<sub>1</sub>：プロスタグランジンE<sub>1</sub>、</p> <p>注：添付文書に抗血小板薬と明記されているもののみを抗血小板薬として分類。</p> <p>注：施設により対応の違いがある薬物も含まれる</p>	① 抗血小板薬	一般名	商品名	作用機序	作用の可逆性	半減期	一般的な術前休止期間	アスピリン (アセチルサリチル酸)	アスピリン	バファリン	COX阻害	不可逆的	0.4時間	5～7日	チカロピジン	パナルジン	ADP受容体拮抗	不可逆的	1.6時間	7～10日	クロピドグレル	ブラスグレル	ADP受容体拮抗	不可逆的	7時間	7～10日	ブラスグレル	エフィエント	ADP受容体拮抗	不可逆的	1～5時間	7～10日	チカグレゾール	プリリント	ADP受容体拮抗	可逆的	0.5～4時間	3～5日	シロスタゾール	プレタール	PDE阻害	可逆的	18時間	2～3日	ジビダモール	ベルサンチン、ジビダモールJG	PDE阻害、TXA <sub>2</sub> 合成抑制	可逆的	0.5時間	1日	② 抗血小板作用を有する薬剤	サルボグレレート	アンブラーグ	5-HT <sub>2</sub> 阻害	可逆的	0.7時間	1日	イコサペント酸	エタナセプト酸	TXA <sub>2</sub> 合成抑制	不可逆的	28時間	7～10日	ペラプロスト	ドルナー	PGI <sub>2</sub> 誘導体	可逆的	1.1時間	1日	トラビジル	ロコルナール、エステリノール	TXA <sub>2</sub> 合成阻害	可逆的	6時間	1日	ジラゼブ	コメリアン	TXA <sub>2</sub> 合成阻害	可逆的	4時間	2～3日	リマプロストアルファテクス	オバルモン	PGE <sub>1</sub> 誘導体	可逆的	0.5時間	1日	オザグレレ	ベガ、ドメナン	TXA <sub>2</sub> 合成阻害	可逆的	1.5時間	1日																																																																																																																									
① 抗血小板薬	一般名	商品名	作用機序	作用の可逆性	半減期	一般的な術前休止期間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
アスピリン (アセチルサリチル酸)	アスピリン	バファリン	COX阻害	不可逆的	0.4時間	5～7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	チカロピジン	パナルジン	ADP受容体拮抗	不可逆的	1.6時間	7～10日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
クロピドグレル	ブラスグレル	ADP受容体拮抗	不可逆的	7時間	7～10日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ブラスグレル	エフィエント	ADP受容体拮抗	不可逆的	1～5時間	7～10日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
チカグレゾール	プリリント	ADP受容体拮抗	可逆的	0.5～4時間	3～5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
シロスタゾール	プレタール	PDE阻害	可逆的	18時間	2～3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ジビダモール	ベルサンチン、ジビダモールJG	PDE阻害、TXA <sub>2</sub> 合成抑制	可逆的	0.5時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
② 抗血小板作用を有する薬剤	サルボグレレート	アンブラーグ	5-HT <sub>2</sub> 阻害	可逆的	0.7時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	イコサペント酸	エタナセプト酸	TXA <sub>2</sub> 合成抑制	不可逆的	28時間	7～10日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ペラプロスト	ドルナー	PGI <sub>2</sub> 誘導体	可逆的	1.1時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
トラビジル	ロコルナール、エステリノール	TXA <sub>2</sub> 合成阻害	可逆的	6時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ジラゼブ	コメリアン	TXA <sub>2</sub> 合成阻害	可逆的	4時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
リマプロストアルファテクス	オバルモン	PGE <sub>1</sub> 誘導体	可逆的	0.5時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
オザグレレ	ベガ、ドメナン	TXA <sub>2</sub> 合成阻害	可逆的	1.5時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
① 抗血小板薬	一般名	商品名	作用機序	作用の可逆性	半減期	一般的な術前休止期間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
アスピリン (アセチルサリチル酸)	アスピリン	バファリン	COX阻害	不可逆的	0.4時間	5～7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	チカロピジン	パナルジン	ADP受容体拮抗	不可逆的	1.6時間	7～10日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
クロピドグレル	ブラスグレル	ADP受容体拮抗	不可逆的	7時間	7～10日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ブラスグレル	エフィエント	ADP受容体拮抗	不可逆的	1～5時間	7～10日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
チカグレゾール	プリリント	ADP受容体拮抗	可逆的	0.5～4時間	3～5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
シロスタゾール	プレタール	PDE阻害	可逆的	18時間	2～3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ジビダモール	ベルサンチン、ジビダモールJG	PDE阻害、TXA <sub>2</sub> 合成抑制	可逆的	0.5時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
② 抗血小板作用を有する薬剤	サルボグレレート	アンブラーグ	5-HT <sub>2</sub> 阻害	可逆的	0.7時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	イコサペント酸	エタナセプト酸	TXA <sub>2</sub> 合成抑制	不可逆的	28時間	7～10日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ペラプロスト	ドルナー	PGI <sub>2</sub> 誘導体	可逆的	1.1時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
トラビジル	ロコルナール、エステリノール	TXA <sub>2</sub> 合成阻害	可逆的	6時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ジラゼブ	コメリアン	TXA <sub>2</sub> 合成阻害	可逆的	4時間	2～3日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
リマプロストアルファテクス	オバルモン	PGE <sub>1</sub> 誘導体	可逆的	0.5時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
オザグレレ	ベガ、ドメナン	TXA <sub>2</sub> 合成阻害	可逆的	1.5時間	1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		