



MARUTANE  
Quality Seeds

Carrot にんじん

一代交配

# パープルターゲット (MCX-509)

内部まで紫色に着色し、品質に優れたパープルキャロット。

## 特 性


- ① 外観はテリのある濃紫色を呈し、内部も芯まで紫色のたいへん美しい人参です。いろどりを活かしてサラダやマリネで楽しむのはもちろん、内部まで紫色である事を利用して、ジュースやドレッシング用途にも適します。
- ② 播種後 120 日程度で根長 20 ~ 23 cm、根径 3 cm くらいの人参が収穫できますが、スティック人参等の若どりで収穫する場合は、播種後 60 日くらいから収穫が可能です。
- ③ 草勢は中位でたいへん作りやすく、揃いにも優れています。抽苔は比較的遅く、平坦地の春まきと夏まきや冷涼地の 6 月まきも可能です。
- ④ 耐暑・耐寒性にも優れ、裂皮や裂根も極めて遅く、在圃性は抜群です。



内部の色も紫色です。

## 栽培のポイント!

- ① 土壌水分が多いと色素が流亡し、内部まで紫色に着色しない場合がありますので、排水条件のよい圃場での栽培をお勧めします。
- ② 発芽不良の原因となりますので、発芽までは土壌を適湿に保ちます。
- ③ 生育後期に肥料が遅効きすると、葉が過繁茂になり皮目がある原因となりますので留意します。
- ④ 比較的、抽苔の遅い品種ですが、無理な早播きは避けるようにします。



## コート種子の取り扱いについて!

発芽適温: 15 ~ 25℃

発芽までの日数: 6 ~ 10

### コート種子とは!

種子の表面を天然物の成分でコートし、取り扱いやすいように成形したものです。発芽・生育の揃いが良くなり、また 1 粒ずつの播種が出来るので間引きの手間が省けます。間引き残しや、間引き時の傷みが少なくなり、品質と収量が向上します。

### コート種子播種時の注意点

灌水は播種前に十分行い、乾燥した圃場にまかないようにしてください。覆土は 5 ~ 10mm を目安とし、乾燥期や乾きやすい砂質土ではやや厚めに、土壌水分が多い時期や固まりやすい土壌では薄めとします。灌水した後は発芽まで種子を絶対乾かさないように注意します。播種期が高温となる 7 月 ~ 8 月上旬の播種では、もみ殻や遮光資材を活用し表土の乾燥を防ぎます。また、乾きやすい土質では 1 日に朝と夕方の 2 回灌水することをおすすめします。(播種後に灌水した状態で発芽するまでに乾燥させてしまうとコーティングの材質が硬化し、発芽できなくなります。)

