



MARUTANE
Quality Seeds

金賞

Japanese Green ミズナ

ハウス周年栽培用

早生はりはり京水菜

繊維質少なくシャリシャリした食感は格別
特にサラダ等の生食に最適の早生豊産種

特性

- ① 葉色は「金賞 早生千筋京水菜」よりやや濃緑色、葉軸は極細で非常に白く、葉の緑色と軸の白色のコントラストが美しい品種です。
- ② 小～中株採り栽培では播種後30日位から収穫出来る周年栽培可能な早生種です。
- ③ 葉軸の繊維質が少なくシャリシャリ感のある歯ごたえは格別で、サラダ等の生食用に最適です。



栽培のポイント!

- ① ほぼ周年出荷が出来る品種ですが、夏期高温時の栽培で地際部が節間伸長することがあるので注意が必要です。


圃場の準備

肥料は元肥を中心に、三要素各10kg/10aを基準とし、夏期は各6～8kg/10a、冬季には各12～13kg/10aを目安とします。立枯病など土壌病害予防のため、定期的に土壌消毒を行うことが望ましいです。

播種・育苗

うね幅120～150cmで条間8～10cmを基準とします。播種はシートテープを用いて直播きします。株間は5cm間隔で1粒まきし、間引きしません。播種後十分に灌水し、寒冷紗で被覆して一斉に発芽させます。

下記標準栽培表参考に貴地の気候に合わせて栽培してください。



収穫までの管理

早春のハウス栽培では抽苔しやすくなります。特に生育初期の低温は、花芽分化を促進させますので注意が必要です。春・秋の暖かい日はハウス内の換気を充分に行い軟弱徒長を防ぎます。

収穫・出荷

草丈28cm位になれば順次収穫します。収穫後は急速に品質が低下しますので、速やかに子葉・枯葉・根部を除去し、調整・袋詰めを行います。この時できるだけ水洗いはしないようにします。

病虫害防除

水菜は茎葉部を食しますので、病虫害防除は生育初期の予防的散布を基本とします。小～中株採りの害虫防除には被覆資材を用いて葉散回数を少なくします。

主な病害虫

- ベト病、白斑病、白さび病、軟腐病、立枯病
- コナガ、カブラハバチ、キスジノミハムシ、ヨトウムシ、アブラムシ