

医薬品を正しく購入するための 説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	リアップリジェンヌ
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 1.0g パントテニールエチルエーテル 1.0g トコフェロール酢酸エステル 0.08g l-メントール 0.3g
3	用法・用量	成人女性（20 才以上）が、1 日 2 回、1 回 1 mL を脱毛している頭皮に塗布してください。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用しないでください <ol style="list-style-type: none"> 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 未成年者（20 才未満）。 妊婦又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。 妊娠、出産に伴い脱毛している人。 避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。 頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。 頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。 男性。 次の部位には使用しないでください <ol style="list-style-type: none"> 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。 きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> 今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。 高血圧の人、低血圧の人。 心臓又は腎臓に障害のある人。 むくみのある人。 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。 高齢者（65 才以上）。 次の診断を受けている人。 甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。



包装	60mL
----	------

〈商品特長〉

- ◆リアップリジェンヌは、女性の壮年性脱毛症に対して、効能・効果が認められた「医薬品」（一般用医薬品）です。
- ◆有効成分ミノキシジルが毛包に直接作用して、細胞の増殖やタンパク質の合成を促します。その結果、新たな髪が生まれ、太く健康な髪が育ちます。
- ◆さらに女性の頭皮に着目し、頭皮環境をととのえる3つの有効成分（パントテニールエチルエーテル、トコフェロール酢酸エステル、*l*-メントール）を配合しました。