

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アスピタン<デルマ>
2	成分・分量	<2カプセル中> リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB <sub>2</sub> 酪酸エステル) 20mg、 ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> ) 50mg、ニコチン酸アミド 60mg、 ビオチン 0.04mg、ウルソデオキシコール酸 20mg
3	用法・用量	下記の1回服用量を服用します。 <1回服用量>成人(15才以上) 1カプセル、7~14才 1カプセル、 7才未満 服用しないでください <1日服用回数>成人(15才以上) 2回(朝夕)、7~14才 1回、 7才未満 服用しないでください
4	効能・効果	次の諸症状の緩和： 肌あれ、にきび、口内炎、目のかゆみ、口角炎、口唇炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、 かぶれ、ただれ、赤鼻、目の充血。 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない 場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。」 次の場合のビタミンB <sub>2</sub> の補給： 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。