

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	エンペシドL
2	成分・分量	<1錠中>クロトリマゾール 100mg
3	用法・用量	<p>次の量を膣深部に挿入してください。6日間毎日続けて使用してください。</p> <p><1回使用量>成人(15歳以上60歳未満) 1錠 15歳未満及び60歳以上は、使用しないでください。</p> <p><1日使用回数>1回(できれば就寝前)</p> <p>ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は医師の診療を受けてください。</p>
4	効能・効果	膣カンジダの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1)初めて発症したと思われる人。 (2)本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3)15歳未満又は60歳以上の人。 (4)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (5)発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色のついた又は血に染まったおりもの、魚臭いおりもの、生理の停止、膣からの不規則又は異常な出血、膣又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれがある人。 (6)次の診断を受けた人。糖尿病 (7)本疾病を頻繁に繰り返している人。(1~2カ月に1回又は6カ月以内に2回以上) (8)膣カンジダの再発かわからない人。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <p>(1)膣内以外の部位。</p> <p>3. 本剤を使用中に次の医薬品を外陰部に使用しないでください</p> <p>(1)カンジダ治療薬以外の外皮用薬。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <p>(1)医師の治療を受けている人。 (2)本人又は家族がアレルギー体质の人。 (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4)授乳中の人は。</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。