

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	阪本 赤まむし膏
2	成分・分量	本品 1 g 中 日局 次硝酸ビスマス・・・40 mg 日局 サリチル酸・・・19 mg
3	用法・用量	患部の大小により、脱脂綿又は紙に延ばし、1日2回、重症の場合は1日3～4回、患部に貼用します。
4	効能・効果	きりきず、にきび、手足顔のあれ、かゆみ、ひび、あかぎれ、しもやけ、いんきん、たむし、水虫、疥癬、くさ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)</p> <p>1．次の部位には使用しないこと (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 皮膚の弱い部位 (3) 湿疹、陰のう湿疹</p> <p>相談すること</p> <p>1．次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かぶれ、かゆみ等を起こしたことがある人) (2) 患部が広範囲の人 (3) 湿潤やただれのひどい人 (4) 乳幼児 (5) 医師の治療を受けている人</p> <p>2．次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること (1) 服用後、次の症状があらわれた場合 皮ふ・・・発疹・発赤、かゆみ (2) 2週間位使用しても症状の改善がみられない場合</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 1．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2．情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3．使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。