

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	外用ホルモン塗布剤オットピン
2	成分・分量	1mL中 メチルテストステロン 20mg 添加物として精製オットセイ油、ローズ油、オリブ油、エタノール、香料(メントール)を含有
3	用法・用量	使用時によく振り、中栓の滴下口から手のひらに3~6滴(1滴は約0.03g)を滴下し、男性器、並びに内股等に塗布してください。1日3~5回塗布してください。
4	効能・効果	男子更年期及び更年期以後における精力減退、勃起力不全、早漏、陰萎、遺精、前立腺漏、精液漏、男女恥部無毛症、更年期障害(頭痛、倦怠、記憶力減退)、男子一般老衰現象の予防及び回復
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないこと</p> <p>(1)本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)ご使用前に本剤をビンから3~6滴程出し、内股などの皮ふのうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人。</p> <p>(3)アンドロゲン依存性腫瘍[例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍(悪性)]及びその疑いのある人。</p> <p>(4)妊娠又は妊娠している可能性のある女性、授乳中の女性。</p> <p>(5)小児(15歳未満)。</p> <p>(6)排尿困難を伴う前立腺肥大のある人。</p> <p>(7)前立腺検査※の結果、前立腺特異抗原(PSA)の値が2.0ng/mL以上の人。(医師の判断に従うこと。) ※本剤の有効成分(メチルテストステロン)は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります。a)特に50歳以上の男性は前立腺腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります。b)継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります。c)検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師又は薬剤師に相談すること。</p> <p>(8)睡眠時無呼吸症候群である人。</p> <p>2. 次の部位には使用しないこと</p> <p>(1)目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻孔等) (2)陰茎部先端(尿道口)、外陰部</p> <p>(3)外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位</p> <p>3. 本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだいすれの医薬品も使用しないこと</p> <p>4. 使用者以外へ付着させないこと</p> <p>(1)ご使用後は石鹼とぬるま湯で手を十分に洗って下さい。</p> <p>(2)本剤を使用者以外の人に付着させないよう注意して下さい。付着した場合は直ちに洗い流して下さい。</p> <p>(3)塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹼とぬるま湯で十分に洗い流して下さい。</p> <p>次に該当する人は、お申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。・薬や化粧品等によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・本人又は家族がアレルギー体质の人。・前立腺肥大ではあるが、排尿困難を伴わない人。 ・重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧またはその既往症のある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。