

# 医薬品を正しく購入するための

## 説明文書

第1類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1 | 名称                    | トノス   |
| 2 | 成分・分量                 | 本品 100g 中 テストステロン 1g、アミノ安息香酸エチル 10g、プロカイン塩酸塩 0.5g、ジブカイン塩酸塩 1g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 0.5g を含有する。<br>添加物として白色ワセリンを含有する。  |
| 3 | 用法・用量                 | 男子更年期障害には患部又は皮膚柔軟部に毎日一回、約 0.1g(小豆大)ずつよくすりこむように塗擦し、好転したら隔日又は週 2 回にする。男性性器神経衰弱症(早漏、勃起力減退等)で直接性器に塗る。<br>【詳しいご使用方法(推奨)】<br>●早漏等射精時間の遅延化:行為 20~30 分前に 5mm を亀頭部(亀頭冠)によくすり込むように塗る。<br>麻ひ感が生じたら石鹼などで洗い落してください。なるべく少量から使用してください。<br>(まれに効きすぎて勃起力が低下することがあります)<br>●勃起力減退、精力減退などの症状の改善:1 日 1 回、5mm を陰のう部全体によくすり込むように塗る。<br>改善が認められたら、1 日おきか週 2 回程度に塗る回数を減らしてください。  |
| 4 | 効能・効果                 | 男子更年期障害、男性性器神経衰弱症(早漏、勃起力減退、性器不全、精力減退、遺精、夢精等)  |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 1. 次の人は使用しないでください。<br>(1) 本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人<br>(2) 使用前に本剤をチューブから 5mm 程度出し、内股などの皮膚のうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人<br>(3) アンドロゲン依存性腫瘍[例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍(悪性)]及びその疑いのある人<br>(4) 女性<br>(5) 小児(15 歳未満)<br>(6) 排尿困難を伴う前立腺肥大のある人<br>(7) 前立腺検査の結果、前立腺特異抗原(PSA)の値が 2.0ng/mL 以上の人<br>(医師の判断に従ってください)<br>(8) 睡眠時無呼吸症候群である人<br>2. 次の部位には使用しないでください。<br>(1) 目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻孔等)<br>(2) 陰茎部先端(尿道口)<br>(3) 外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位<br>3. 本剤を使用している間は、次の医薬品を使用しないでください。<br>男性ホルモンを含んだ医薬品<br>4. 使用者以外へ付着させないでください。<br>(1) 使用後は石鹼とぬるま湯で手を十分に洗ってください。<br>(2) 本剤を使用者以外の人に付着させないように注意してください。<br>付着した場合は直ちに洗い流してください。<br>(3) 塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、<br>塗布部を石鹼とぬるま湯で十分に洗い流してください。 |
| 6 | 薬剤師が必要と判断する事項         |   |

### 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。