みかん専用リン酸資材

収穫前に

着色促進、
ベニの強化、
花芽分化促進、
結実安定に

1kg入り **ベニダスK**

ロイヤルりん加里

1kg入り

収穫後に

花芽の充実、
耐寒性強化に

RIC
www.kelpak.co.jp
SINCE 1979

ロイヤル インダストリーズ株式会社
〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-15-19
TEL 03(3489)1408　FAX 03(3489)9308

ベニダスK

肥料登録番号　生第92382号

収穫 前



結実安定に!

成分

水溶性リン酸（P_2O_5）　54.0%
水溶性カリ（K_2O）　7.0%
pH 7.0

用途

花芽分化促進、結実安定、水入り促進、
着色強化、糖度アップ、耐寒性強化、減酸

使用方法

・耐寒性強化と花芽分化を確実にするために秋季に、また収穫後に3000倍液をそれぞれ散布する。
・結実安定、水入り促進のために5～6月の間に3000倍液を1～2回散布する。
・着色強化のために10～11月の間に2000倍液を2回散布する。
・秋季の紅を濃くするため、また糖度アップを図りたいときは本材の2000～3000倍を加用すると一層紅が濃くなります。

※本材は中性であるため殆どの肥料・農薬と混用できます。但し、「石灰硫黄合剤」との混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用は行わないこと。

吸収の速い形態のリン酸です。

ロイヤルりん加里

肥料登録番号　輸第6494号

収穫 後

耐寒性強化に!

成分

水溶性リン酸（P_2O_5）　51.0%
水溶性カリ（K_2O）　34.0%
pH 3.8～3.9

用途

みかんの花芽充実、耐寒性強化

使用方法

・耐寒性強化と花芽充実を確実にするために12～2月の間に2000倍液を2回散布。

※「石灰硫黄合剤」との混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用は行わないこと。

リン酸・カリの両成分とも多いので耐寒性強化花芽分化・結実安定には有効だが、カリが多い分果皮が厚くなるという欠点もあるので、中期・後期は本材に代え、ベニダスKの使用をお勧めします。

2023.06