ロイヤル 亜りん酸カリ液

肥料登録番号　生第 93268 号

成　分（%）

水溶性りん酸	水溶性加里	ケルパック 66（海藻エキス）
33.0	22.0	30.0

特　長

●亜りん酸カリウムは通常のりん酸カリウムと異なり、分子量が小さいため速やかに作物に吸収され、少ない量でりん酸カリウムの肥効が表れます。

●本材を吸収した作物は超元気になり、根量が増え、光合成能が高まるため、増収し品質が良くなります。

●ケルパック６６（海藻エキス）を配合してあるため、発根及び光合成能のより一層高まります。

●低温、日照不足の生育遅れの回復にも効果があります。

●pH4.9 の液体です。

RIC
www.kelpak.co.jp
SINCE 1979
ロイヤル インダストリーズ株式会社
〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-15-19
TEL 03(3489)1408　FAX 03(3489)9308

ロイヤル亜りん酸カリ液

使用方法

作物	使用時期	使用目的	希釈倍率（倍）	使用方法
果菜類	育苗期	健苗育成	500 ～ 1000	浸漬または潅注
			1000 ～ 2000	葉面散布
	開花期	花芽の充実、着果促進	1000 ～ 2000	葉面散布
	果実肥大期	果実成長		
葉菜類	育苗期	健苗育成	500 ～ 1000	浸漬または潅注
			1000 ～ 2000	葉面散布
	定植以降	徒長防止、品質向上	500 ～ 1000	潅注
			1000 ～ 2000	葉面散布
根菜類	定植以降	収量増加、品質向上	1000 ～ 2000	葉面散布
果樹	開花前	花芽の充実	1000 ～ 2000	葉面散布
	果実肥大期	品質向上		
豆類	定植から着蕾期	莢数増加	500 ～ 1000	潅注
			1000 ～ 2000	葉面散布

注意事項

●高濃度での使用は薬害の恐れがありますので、使用濃度に注意してください。
●高温期に使用すると果皮障害が起きる可能性があるので、使用はお控え下さい。
●他剤との混用を行う場合、混和性・薬害等を確認のうえご使用ください。
●直射日光を避け、冷涼な場所で保管してください。
●「石灰硫黄合剤」と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用は行わないで下さい。

包装規格

1L×15 本 / ケース、5L エーステナー入り ×4 本 / ケース、10L エーステナー入り

2022.9