



# ロイヤル 亜りん酸カリ液

肥料登録番号 生第 93268 号

保証成分 (%)

水溶性りん酸

33.0

水溶性加里

22.0

含有成分 (%)

ケルパック 66  
(海藻エキス)

15.0

## 特長

- 亜りん酸カリウムは通常のりん酸カリウムと異なり、分子量が小さいため速やかに作物に吸収され、少ない量でりん酸カリウムの肥効が表れます。
- 本材を吸収した作物は超元気になり、根量が増え、光合成能が高まるため、増収し品質が良くなります。
- ケルパック 66 (海藻エキス) を配合してあるため、発根及び光合成能のより一層高まります。
- 低温、日照不足の生育遅れの回復にも効果があります。
- pH4.9 の液体です。



**ロイヤル インダストリーズ株式会社**

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-15-19  
TEL 03(3489)1408 FAX 03(3489)9308

# ロイヤル重りん酸カリ液



## 使用方法

作物	使用時期	使用目的	希釈倍率（倍）	使用方法
果菜類	育苗期	健苗育成	500～1000	浸漬または灌注
			1000～2000	葉面散布
	開花期	花芽の充実、 着果促進	1000～2000	葉面散布
	果実肥大期	果実成長		
葉菜類	育苗期	健苗育成	500～1000	浸漬または灌注
			1000～2000	葉面散布
	定植以降	徒長防止、 品質向上	500～1000	灌注
			1000～2000	葉面散布
根菜類	定植以降	収量増加、 品質向上	1000～2000	葉面散布
果樹	開花前	花芽の充実	1000～2000	葉面散布
	果実肥大期	品質向上		
豆類	定植から着蕾期	莢数増加	500～1000	灌注
			1000～2000	葉面散布

## 注意事項

- 高濃度での使用は薬害の恐れがありますので、使用濃度に注意してください。
- 高温期に使用すると果皮障害が起きる可能性があるため、使用はお控えください。
- 他剤との混用を行う場合、混和性・薬害等を確認のうえご使用ください。
- 直射日光を避け、冷涼な場所で保管してください。
- 「石灰硫黄合剤」と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用は行わないでください。

## 包装規格

1L×15本 / ケース、5L エーステナー入り ×4本 / ケース、10L エーステナー入り