肥料登録番号　生第77416号

徒長防止、着蕾増、着果強化
着色増進、糖度アップに！

色一番E

葉面散布用　　**粉状　1kg入り**



特　長

0% ＋ 42% ＋ 28% ＋ 苦土　亜鉛　マンガン　モリブデン　ホウ素　銅　鉄

チッソ　リン酸　カリ　微量要素

- リン酸、カリの含有量が多いため、徒長防止、着蕾増、着果強化着色増進、果実肥大、糖度アップに効果が期待できます。
- 1000～2000倍の低濃度で使用できるため、経済的です。

製造元
RIC® www.kelpak.co.jp SINCE 1979
ロイヤル インダストリーズ株式会社
〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-15-19
TEL 03(3489)1408　FAX 03(3489)9308

使用目的と使用方法

標準使用倍率：1000～2000倍　（1000倍に薄めたときPH：6.3）

本材は、海藻エキス「ケルパック66」と混用するとさらに効果が高まります。

作物名		使用目的	散布時期と回数	ケルパック66 混用倍率
苗全般		健苗育成	育苗期に1～3週あけて1～2回	5000倍
果樹	りんご みかん サクランボ 桃・梨・柿 キウィ ぶどう	着蕾・着果強化 徒長防止	伸長期に2～4週あけて1～2回	1500～2000倍
		果実肥大 着色促進 糖度アップ	収穫の1～3ヶ月前から2～4週あけて2回 (桃には1500～2000倍が最適)	3000倍 (この時期の温州みかんには ベニダスKを使用する)
	ぶどう	花振い防止	5～6葉期と開花20～10日前に 1000倍液を各1回	1000倍
果菜類	メロン すいか トマト・なす ピーマン きゅうり いちご	徒長防止 着蕾・着果強化 肥大・成熟促進 成り疲れ防止 収量アップ 食味向上	着蕾期から2～4週おきに3～5回	3000倍
葉菜類	ほうれん草 レタス・白菜 キャベツ	健苗育成 徒長防止 品質向上	本葉2～3枚頃、または、定植直後から 1～3週あけて2回	3000倍
根菜類	にんじん 大根・かぶ ごぼう	健苗育成 徒長防止 品質向上	本葉2～3枚頃から1～3週あけて2回	1500倍
草花		着蕾促進 花色強化	着蕾前と、開花前の計2回	3000倍

＊葉面散布の代わりに土壌潅水する場合は、1～5kg/10aを1000～2000倍にうすめ潅水チューブで流します。

成　分

保証成分(%)					含有成分(%)			
水溶性リン酸	水溶性カリ	水溶性苦土	水溶性マンガン	水溶性ホウ素	鉄	モリブデン	亜鉛	銅
42.0	28.0	2.0	0.40	0.50	0.16	0.06	0.06	0.02

注意事項

・石灰硫黄合剤と混ぜると有毒ガスが発生するおそれがあり危険ですので混用しないで下さい。
・本品は大変吸湿性が高いので、使用後はチャックをしっかり閉めて保管して下さい。
吸湿し、べとついてしまった場合でも効力に変わりはありませんので、安心してご使用下さい。
・幼児の手の届かない所に保管して下さい。

包装形態

1kgチャック付きナイロン・ポリ袋入り　　1kg入り×20袋/ケース

2022.05