葉面散布にも土壌施肥にも使える Fe(鉄)入り硫マグ

鉄入り

硫酸苦土肥料

マグミーFe®

肥料登録番号：輸第 12919 号

保証成分

水溶性苦土（MgO）15.4%

含有成分

鉄（Fe）0.54%

RIC
www.kelpak.co.jp
SINCE 1979

ロイヤル インダストリーズ株式会社
〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-15-19
TEL 03(3489)1408　FAX 03(3489)9308

鉄入り 硫酸苦土肥料

マグミーFe®

葉面散布にも土壌施肥にも使える Fe(鉄)入り硫マグ

特長と効果

本材はざらめ状の薄緑色透明な結晶です。元肥として使用する他、水に容易に溶けるため葉面散布にも適した製品です。硫マグは保管中に固まりやすいものですが、本材は固まりにくいため、使い勝手のよい製品です。

本材は硫マグと鉄の混合物です。マグネシウム（苦土）と鉄は葉緑素の重要な原料であるため、本材を使用した作物は光合成能が高まり、糖の生成量が増加します。

また、苦土はリン酸・ケイ酸が植物体内に取り込まれる際に相助的・協調的に働くため、欠乏するとリン酸などの吸収が阻害され品質低下や収量減につながります。このように苦土は重要なミネラルであるため不足しないように与えてください。過不足なく与えることにより、光合成能は高まり、糖度向上が期待できます。

対象作物

- 水稲、麦、トウモロコシ、ソバなどの穀類
- トマト、キュウリ、ナス、メロン、スイカなどの果菜類
- リンゴ、みかん、モモ、ブドウ、梨、梅などの果樹類
- 大根、人参、ごぼうなどの根菜類
- 白菜、レタス、ほうれん草などの葉菜類
- 茶、はなやさい、ブロッコリー、アスパラガス、草花、ビートなどの特用作物
- 馬鈴薯、さつまいも、里いも、長いもなどのいも類
- 玉ねぎ、にんにく、ねぎ、百合、球根などの硫黄成分を好むユリ科の植物
- 大豆、小豆、インゲン、落花生などの豆類

使用時期と使用方法

使用方法	使用時期	使 用 量
土壌施用	元肥	10a あたり 40～60kg 施用する。
	追肥	10a あたり 10～20kg を適宜うすめ 1～2 回株元へ潅水する。
葉面散布	通常時	500～1000 倍液を 1～2 週間あけて 3～5 回散布する。
	欠乏時	欠乏がひどい場合　100 倍液を散布 中程度の場合　150～200 倍液を散布 軽い場合　250～300 倍液を散布

包装形態

20kg ポリ袋入り

2021.11