

保険薬事典 Plus⁺

令和5年4月版

薬効別薬価基準

本書の内容と使い方

1. 薬価基準収載品目（令和5年3月3日告示まで）および避妊剤，ED治療剤，男性型脱毛症剤，放射性物質除去剤を内用薬，注射薬，外用薬および歯科用薬剤の順に掲載した。
2. 各製品の分類は，日本標準商品分類，薬価基準収載医薬品コードの先頭4桁を基にした。従って，薬効が2つ以上に及ぶ場合も1箇所収録した。
3. 赤字の一般名（成分名）および商品名は官報告示品目であることを示し，黒字の商品名は一般名収載品目（非告示品目），および避妊剤等の薬価基準未収載品目を示す。
4. 巻末には，薬効分類目次，再生医療等製品，保険医及び保険薬剤師の使用医薬品，医薬品略名一覧，会社連絡先一覧を掲載した。
5. 索引には，本文中の商品名，一般名，薬価基準収載名称（日本薬局方医薬品の局方名，生物学的製剤基準収載品はその基準名等），また配合剤にあつては，一般名のほか，その内容や性状を表すいわゆる通称（高カロリー輸液用基本液，パップ剤等）を記載した。
6. 本書の内容は，令和5年2月28日までに入手できた添付文書等を基に作成した。

【本書の記号・略号】

- ㊦：第18改正日本薬局方収載品目
㊧：銘柄収載の日本薬局方医薬品
㊨：統一名収載品目
㊩：低価格のため統一名収載となった日本薬局方医薬品
㊪：診療報酬点数表における後発医薬品
先：同剤形・規格に後発品がある先発医薬品
先：他剤形・規格に後発品がある先発医薬品
先：他剤形・規格にも後発品がない先発医薬品
☆：より安価な後発品が存在しない先発医薬品
㊫：令和6年3月31日までが使用期限の告示品目（経過措置品目）
㊬：令和5年9月30日までが使用期限の告示品目（経過措置品目）
先：準先発品〔昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品（その後の剤形追加・規格追加等を含む）のうち，価格差のある後発医薬品があるもの〕
後除：同額・高額のため加算対象となる後発品とはみなさない（除外）品目

- ：毒薬 ㊭：麻薬 適応：効能・効果
●：劇薬 ㊮：向精神薬 用法：用法・用量
●：覚醒剤原料 ㊯：処方箋医薬品 その他の薬効：収録箇所以外の薬効
- | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|
| ㊰……末剤 | ㊱……シロップ剤 | ㊲……腔用剤 | ㊳……噴霧剤 |
| ㊴……散剤 | ㊵……シロップ用剤 | ㊶……坐薬 | ㊷……吸入剤 |
| ㊸……複粒剤 | ㊹……液剤 | ㊺……洗腸剤 | ㊻……貼付剤 |
| ㊼……顆粒剤 | ㊽……注射剤 | ㊾……注腸剤 | ㊿……パウダー |
| ㊿……細粒剤 | 注用…注射用剤 | 膏…軟膏（膏薬）剤 | ト…トローチ剤 |
| 錠…錠剤 | 筋…筋注用剤 | 乳…クリーム | 含…含嗽剤 |
| 錠…パッカ剤 | 静…静注用剤 | ゼ…ゼリー | |
| 錠…カプセル剤 | キ…キット | ゲ…ゲル剤 | |

なお、令和5年度薬価基準において、後発医薬品の数量シェア換算における分類（下記*参照）の対応は以下の通りである。

- 先 分類1※：後発医薬品がない先発医薬品（後発医薬品の上市前の先発医薬品等）
- 先 + 先 分類2：後発医薬品がある先発医薬品（先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む）
- 後 分類3：後発医薬品
- 後除 「★」印が付されたもの（先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品）
- ☆ 「☆」印が付されたもの（後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品）

※令和5年度改定で基礎的医薬品とされた先発品を除く

したがって、本書における換算率の計算は、

後発医薬品の数量シェア（置換え率）

$$\begin{aligned} & \frac{\text{〔後発医薬品の数量〕}}{\text{〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕}} \\ & = \frac{\text{〔3で分類される品目の数量（★を除く）〕}}{\text{〔〔2で分類される品目の数量（☆を除く）〕 + 〔3で分類される品目の数量（★を除く）〕〕}} \\ & = \frac{\text{〔後で分類される品目の数量〕}}{\text{〔〔先および先で分類される品目の合計数量〕 + 〔後で分類される品目の数量〕〕}} \end{aligned}$$

*厚生労働省HP「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について

（令和5年4月1日適用）」

各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、1：後発医薬品がない先発医薬品（後発医薬品の上市前の先発医薬品等）、2：後発医薬品がある先発医薬品（先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、「☆」印を付しています。）と3：後発医薬品（先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。）として分類しています。なお、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品及び令和5年度薬価基準改定において、同一成分及び同一剤形区分の品目が全て「基礎的医薬品」の対象となった成分については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄となっています。

「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」（厚生労働省平成25年4月5日）に基づく後発医薬品の数量シェア（置換え率）※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。

※後発医薬品の数量シェア（置換え率）

$$\begin{aligned} & = \frac{\text{〔後発医薬品の数量〕}}{\text{〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕}} \\ & = \frac{\text{〔3で分類される品目の数量（★を除く）〕}}{\text{〔〔2で分類される品目の数量（☆を除く）〕 + 〔3で分類される品目の数量（★を除く）〕〕}} \end{aligned}$$

凡 例

<本 文>

①	②	③	④	⑥
● アダージョ	10 g	26.20	(パーパー薬品 四季=秋製薬)	
			アダージョ (金星) (感星薬品)	●
			アダージョ「トオル」 (武満)	●
● アダージョ	10 g	28.40	● アダージョ「マーラー」 (第五薬品)	
	"	27.50	アダージョ.AG (バツハ製薬)	
			「アリア」アダージョ (ヘンデル)	
	"	26.80	● アダージョ (チャイコ)	
			アダージョ (弦楽製薬)	
			⑤	
<p>①注 ●関節リウマチ、リウマチ熱、変形性関節症。●次の疾患の解熱・鎮痛／急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)。●川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)。●(●はアダージョ「トオル」・同「マーラー」のみ)</p>			<p>⑦ ②注 ●1回0.5～1.5g、1日1～4.5g。●1回0.5～1.5g、頓用。原則として1日2回まで。以上、1日最大4.5g。●急性期有熱期間1日30～50mg/kg、分3。解熱後の回復期～慢性期1日1回3～5mg/kg。</p>	

①成分

・一般名(成分名)が赤字のものは、薬価基準記載の日本薬局方医薬品、統一名称記載医薬品(生薬、血液製剤、ワクチン類、一般名記載品目※)等を示す。

※一般名記載品目：錠剤間の価格差が著しい品目において、低価格に属する医薬品が、商品名でなく一般名(成分名)で薬価基準記載されている品目

・黒字で記載したものは、一般名(成分名)または配合成分名称であることを示す。

②注 高カロリー輸液用基本液、パップ剤等、編集の便宜上付した名称を含みます。また、これらの名称に付してあるカッコ付きの数字は、参考として組成や剤形等を区別するためのものであり、数字自体に意味はありません。

・日本薬局方医薬品は品名の前に「●」または「●」を、統一名称記載品目には「●」を表示した。また、低価格のため統一名称記載品となったもののうち、日本薬局方医薬品と考えられるものには「●」を表示した。診療報酬点数表の扱いにより前掲の「● 後除 ● 先 ● 先 ● ☆」等のマークを表示した。

②規格単位

・薬価告示に従い、その品目の規格単位を記載した。

③薬価

・令和5年3月3日告示(それ以降に薬価基準記載・改定等された品目はその官報告示日)の薬価を示す(消費税を含む)。

④配合成分

・配合剤の場合は、配合されている有効成分、もしくは編集部で便宜上付した総称を記載した。単剤の場合は、塩基が違う成分量で有効成分が示されている場合の有効成分量を記載した。

・当該成分に別名がある場合、別名を表記した。

・当該成分中に薬価基準記載名称が一般名と同一の商品がある場合は、カッコ囲みで会社名を記載した。

⑤商品名（会社名）

- ・赤字の商品名は薬価基準収載医薬品を、黒字は統一名収載品目であることを示す。
- ・会社名は、2社以上をイコール（＝）で結んで表記している場合、先頭が製造販売承認取得会社、それ以降は販売会社であることを示す。
- ・内用薬の商品名の末尾に付された *マークは小包装品（100錠又は100カプセル程度以下の包装形態）があることを示す。

⑥備考

- ・医療機関において加算の調剤料を算定できる麻薬、覚醒剤原料、毒薬及び向精神薬にはそれぞれ、**㉞****㉟****㊱**のマークを付した。
- ・劇薬には、**㊲**のマークを付した。ただし、マークがある品目であっても、散剤、細粒剤、顆粒剤であって、1服用単位ごとに分包装されたものは、劇薬から除外される場合もあるので留意されたい。
- ・医薬品医療機器等法に規定される処方箋医薬品については**㊳**のマークを付した。また、生物由来製品は「生物」、特定生物由来製品は「特生物」、再生医療等製品の中で医薬品の例による対応として薬価基準に収載された製品は「再生」と記載した。
- ・一部品目については、処方箋、指示書などに用いられる医薬品の略称を記載した。また、略称の一覧については付録ページにまとめて掲載した。
- ・基礎的医薬品の扱いとなっている品目群については【基礎的】を付した。

⑦適応／用法

- ・**適応**は添付文書の「効能・効果」を、**用法**は「用法・用量」を編集し、簡略表記した。
- ・用法欄の**①****②**……は、適応欄の**①****②**……のそれぞれの疾患に対応させた（一部例外有）。
- ・適応欄の「**▶**」は、同一成分内で適応違いの商品または剤形があることを示す。
- ・予防等、治療目的以外の使用での保険算定に関しては、一部の抗インフルエンザウイルス剤・不妊治療剤のみ記載した。
- ・**その他の薬効**は添付文書に複数の薬効が記載されている一部品目群について、品目が収録されている薬効以外のものを記載した。

<索引>

- ①本文中の商品名、一般名、薬価基準収載名称（日本薬局方医薬品の局方名、生物学的製剤基準収載品はその基準名等）、また配合剤にあつては、一般名のほか、その内容や性状を表すいわゆる通称（高カロリー輸液用基本液、パップ剤等）を記載した。
- ②一般名・通称に相当するものは太字（ゴシック体）で記載した。
- ③商品名に相当するものは細字（明朝体）で記載した。
- ④商品名に接頭語（注射用、小児用、50mg等）の付いたものは、次のように再掲した。

例) 注射用エフオーワイ100

「注射用エフオーワイ100」として〔チ〕の項

「エフオーワイ100〔注射用〕」として〔エ〕の項の2箇所に掲載

品目索引

- 【あ】
- アイエーコール50mg(動注用)……703
 アイエーコール100mg(動注用)…703
 アイオナル・ナトリウム
 (0.2)[注射用]……508
 アイオビジンUD点眼液1%……815
 アイクルシグ錠15mg……356
 アイセントレス錠400mg……478
 アイセントレス錠600mg……479
 アイソボリン点滴静注用25mg…656
 アイソボリン点滴静注用100mg…657
 アイドロイチン1%点眼液……819
 アイドロイチン3%点眼液……819
 アイトロール錠10mg……159
 アイトロール錠20mg……159
 アイノフロー吸入用800ppm…948
 アイビーディカプセル50……370
 アイビーディカプセル100……370
 アイビーディドライシロップ5
 %……371
 アイファガン点眼液0.1%……826
 アイベータ配合点眼液……831
 アイミクス配合錠HD……146
 アイミクス配合錠LD……146
 アイモビーグ皮下注70mgペン…517
 アイラミド配合懸濁性点眼液…831
 アイリーア硝子体内注射液
 40mg/mL……528
 アイリーア硝子体内注射用キッ
 ト40mg/mL……528
 アウドラザイム点滴静注液2.9mg 660
 亜鉛〔塩化〕……889,949
 亜鉛水和物〔酢酸〕……303
 亜鉛水和物〔硫酸〕……896
 亜鉛華……887,888
 亜鉛華単……888
 亜鉛華軟膏各種……887,888
 亜鉛華(10%)単軟膏各種……888
 亜鉛華デンプン……888
- 亜鉛華軟膏……888
 亜鉛水和物・ヨウ素配合剤〔硫
 酸〕……949
 アエントリベンタート静注
 1055mg……655
 アカラプルチニブ……345
 アガルシダーゼ アルファ(遺
 伝子組換え)……657
 アガルシダーゼ ベータ(遺伝
 子組換え)……658
 アガルシダーゼ ベータBS点
 滴静注各種……658
 [アガルシダーゼ ベータ後続1]
 ……658
 アルカボース……314
 アルカボース錠各種……314
 アルカボースOD錠各種……314
 アカンプロサートカルシウム……80
 アキシカプタゲン シロルユ
 セル……720
 アキシチニブ……345
 アキネトン細粒1%……34
 アキネトン錠1mg……34
 アキネトン注射液5mg……513
 アキラルックス点滴静注250mg…711
 アキョウ……383
 アクアチム軟膏1%……876
 アクアチムクリーム1%……876
 アクアチムローション1%……876
 アクセノン末……13
 アクタリット……26
 アクタリット錠各種……26
 アクチット輸液……625
 アクチノマイシンD……690
 アクチバシン注600万……658
 アクチバシン注1200万……658
 アクチバシン注2400万……658
 アクテムラ点滴静注用80mg…776
 アクテムラ点滴静注用200mg…776
 アクテムラ点滴静注用400mg…776
 アクテムラ皮下注162mgオート
 インジェクター……776
 アクテムラ皮下注162mgシリ
 ンジ……776
 アクトシン注射用300mg……533
 アクトシン軟膏3%……908
- アクトス錠15……316
 アクトス錠30……317
 アクトスOD錠15……317
 アクトスOD錠30……318
 アクトネル錠2.5mg……338
 アクトネル錠17.5mg……338
 アクトネル錠75mg……339
 アクブラ静注用10mg……706
 アクブラ静注用50mg……706
 アクブラ静注用100mg……706
 アクマルト輸液……625
 アクメインD輸液……620,621
 アクラシノン注射用20mg……690
 アクラルピシン塩酸塩……690
 アクリジニウム臭化物……840
 アクリノール水和物……869
 アクリノール・チンク油……898
 アグリリンカプセル0.5mg……358
 アクロマイシントローチ15mg…853
 アクロマイシン軟膏3%……875
 アクロマイシン末……875
 アクロマイシンVカプセル50mg…460
 アクロマイシンVカプセル250mg 460
 アコアラン静注用600……759
 アコアラン静注用1800……759
 アコチアミド塩酸塩水和物……235
 アコニップパップ70mg……889
 アコニンサン錠……444
 アコファイド錠100mg……235
 アザクタム注射用0.5g……726
 アザクタム注射用1g……726
 アサコール錠400mg……237
 アザシチジン……698
 アザシチジン注射用各種……698
 アザチオプリン……324
 アザニン錠50mg……324
 アザルフィジンEN錠250mg…465
 アザルフィジンEN錠500mg…465
 亜酸化窒素……801
 亜酸化窒素〔マルフ〕……801
 アシアロシンチ注……713
 アシクロビル
 ……473,474,749,750,815,916

あ

アシクロビル顆粒各種	473	アスタット軟膏1%	902	アーズミンうがい液1%〔アズレン含嗽液〕	844
アシクロビル錠各種	474	アスタットクリーム1%	902	アズレいうがい液4%	845
アシクロビルシロップ8%〔タカタ〕	474	アスタット外用液1%	902	アズレン含嗽用顆粒0.4%〔ツルハラ〕	844
アシクロビルDS各種	474	アステマリン3号MC輸液	618	アズレン含嗽用散0.4%〔トロー〕	844
アシクロビル内服ゼリー各種	474	アストミン散10%	191	アズレン顆粒1%〔ツルハラ〕	206
アシクロビル点滴静注液各種	749	アストミン錠10mg	191	アズレン錠2mg〔ツルハラ〕	206
アシクロビル点滴静注用各種	750	アストミンシロップ0.25%	191	アズレいうがい液各種	845
アシクロビル点滴静注液250mg バッグ100ml〔アイロム〕	750	アズトレオナム	726	アズレン点眼液各種	815
アシクロビル眼軟膏各種	815	アズノール錠2mg	206	アズレン含嗽液アーズミンうがい液1%	844
アシクロビル軟膏各種	916	アズノールうがい液4%	845	アズレンスルホン酸ナトリウム	815
アシクロビルクリーム5%〔ラクール〕	916	アズノール軟膏0.033%	893	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	206,844,845,852
アジスロマイシン	457	アズノールST錠口腔用5mg	852	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	220
アジスロマイシン水和物	456,457,743,814	アスバラ配合錠	280	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン配合顆粒	220
アジスロマイシン細粒各種	456,457	アスバラ注射液	591	アズロキサ顆粒2.5%	206
アジスロマイシン錠各種	457	アスバラ-CA錠200	278	アズロキサ錠15mg	206
アジスロマイシンカプセル各種	457	アスバラカリウム錠50%	280	アセタゾラミド	113
アシタザノラスト水和物	815	アスバラカリウム錠300mg	280	アセタゾラミドナトリウム	536
アシテアダニ舌下錠100単位 (IR)	364	アスバラカリウム注10mEq	590	アセチルコリン塩化物〔注射用〕	525
アシテアダニ舌下錠300単位 (IR)	364	アスバラギナーゼ〔L-〕	698	アセチルシステイン	303,839
アシドレス配合内服液	229	アスバラギン酸カリウム〔L-〕	280,590	アセチルシステイン内用液 17.6%〔あゆみ〕	303
アシノン錠75mg	207	アスバラギン酸カリウム注10 mEqキット〔テルモ〕	590	アセチルスピラマイシン錠100	456
アシノン錠150mg	207	アスバラギン酸カルシウム水和物〔L-〕	278	アセチルスピラマイシン錠200	456
アジマイシン点眼液1%	814	アスピリン	24,294	アセチルフェネトライド	13
アシミニブ塩酸塩	345	アスピリン腸溶錠各種	294	アセテート維持液3G〔HK〕	624,625
アジャスターAコーワ錠40mg	230	アスピリン・ダイアルミネート	301	アセトアミノフェン	22,23,510,803,804
亜硝酸アミル	838	アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤	301	アセトアミノフェン細粒各種	22
アジョピ皮下注225mgオートインジェクター	517	アスピリン・ランソプラゾール配合剤	301	アセトアミノフェン錠各種	23
アジョピ皮下注225mgシリンジ	517	アスファネート配合錠A81	301	アセトアミノフェンシロップ小児用2%〔トロー〕	23
アジルサルタン	122	アスブル液(0.5%)	839	アセトアミノフェンDS小児用各種	23
アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	145,146	アスペノンカプセル10	108	アセトアミノフェン坐剤各種	803,804
アジルバ顆粒1%	122	アスペノンカプセル20	108	アセトキープ3G注	625
アジルバ錠10mg	122	アスベリン散10%	197	アセトヘキサミド	309
アジルバ錠20mg	122	アスベリン錠10	197	アセナピンマレイン酸塩	44
アジルバ錠40mg	122	アスベリン錠20	197	アゼブチン錠0.5mg	363
アジレクト錠0.5mg	39	アスベリンシロップ〔調剤用〕2%	197	アゼブチン錠1mg	363
アジレクト錠1mg	39	アスベリンシロップ0.5%	197	アセメタシン	24
アスコルビン酸	273,586	アスベリンドライシロップ2%	197		
アスコルビン酸注射液各種	586	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)	658		
アスコルビン酸・L-システイン	586	アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入	847		
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	276	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	847		

アゼラスチン塩酸塩	363	アテキユラ吸入用カプセル中用量	847	アドエア500ディスクス60吸入用	848
アゼラスチン塩酸塩錠各種	363	アテキユラ吸入用カプセル低用量	847	アドシルカ錠20mg	182
アセリオ静注液1000mgバッグ	510	アデスタン腔錠300mg	858	アドステロール-I131注射液	716
アゼルニジピン	122,123	アデスタンクリーム1%	901	アトーゼット配合錠HD	179
アゼルニジピン錠各種	122,123	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	698	アトーゼット配合錠LD	179
亜セレン酸ナトリウム	590	アテディオ配合錠	151	アドセトリス点滴静注用50mg	707
アセレンド注100µg	590	アデニン	340,682	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	636
アセンヤク	384	アデノシン	793	アドソルビン原末	226
アゾセמיד	113	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRIJ」	793	アドナ散10%	290
アゾセמיד錠各種	113	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	324,661	アドナ錠10mg	290
アゾルガ配合懸濁性点眼液	832	アデノスキャン注60mg	793	アドナ錠30mg	290
アタザナビル硫酸塩	474	アデノスキャン注60mg	793	アドナ注(静脈用)25mg	626
アタバニン散	204	アデノロール	105	アドナ注(静脈用)50mg	626
アダバレン	907	アデノロール錠各種	105	アドナ注(静脈用)100mg	626
アダバレンクリーム0.1%「ニプロ」	907	アデホスコーワ顆粒10%	324	アドナ注10mg	626
アダバレンゲル各種	907	アデホスコーワ腸溶錠20	324	アトニン-O注1単位	560
アダバレン・過酸化ベンゾイル	909	アデホスコーワ腸溶錠60	324	アトニン-O注5単位	560
アダブチノール錠5mg	100	アデホス-Lコーワ注10mg	661	アトバコン	482
アタラックス錠10mg	68	アデホス-Lコーワ注20mg	661	アトバコン・プログアニル塩酸塩	486
アタラックス錠25mg	68	アデホス-Lコーワ注40mg	661	アドビオール錠5mg	107
アタラックス-P散10%	68	アデホス-Lコーワ注40mg	661	アドフィードパップ40mg	895
アタラックス-Pカプセル25mg	68	アデムバス錠0.5mg	187	アドベイト静注用キット各種	772
アタラックス-Pカプセル50mg	68	アデムバス錠1.0mg	187	アトモキセチン錠各種	44,45
アタラックス-Pシロップ0.5%	68	アデムバス錠2.5mg	187	アトモキセチンカプセル各種	45,46
アタラックス-Pドライシロップ2.5%	68	アデラピン9号注1mL	612	アトモキセチン内用液各種	46
アタラックス-P注射液(25mg/mL)	515	アデラピン9号注2mL	612	アトモキセチン塩酸塩	44,45,46
アタラックス-P注射液(50mg/mL)	515	アデール点滴静注用5mg	531	アトラント軟膏1%	902
アダラートCR錠10mg	163	アテレック錠5	132	アトラントクリーム1%	902
アダラートCR錠20mg	164	アテレック錠10	132	アトラント外用液1%	902
アダラートCR錠40mg	164	アテレック錠20	132	アドリアシン注用10	692
アダリムマブ(遺伝子組換え)	661,662	アーテン散1%	36	アドリアシン注用50	692
アダリムマブBS皮下注シリンジ/ペン各種	661,662	アーテン錠(2mg)	36	アトルバスタチン錠各種	167,168
[アダリムマブ後続1]	661,662	アドエア50エアゾール120吸入用	848	アトルバスタチンOD錠各種	168
[アダリムマブ後続2]	662	アドエア100ディスクス28吸入用	847	アトルバスタチンカルシウム	168
[アダリムマブ後続3]	661,662	アドエア100ディスクス60吸入用	847	アトルバスタチンカルシウム水和物	167,168
アーチスト錠各種	128	アドエア125エアゾール120吸入用	848	アドレナリン	562,855
アディノベイト静注用キット各種	772,773	アドエア250ディスクス28吸入用	848	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	562
アデカット7.5mg錠	120	アドエア250ディスクス60吸入用	848	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	526
アデカット15mg錠	120	アドエア250エアゾール120吸入用	848	アトロピン点眼液1%[日点]	810
アデカット30mg錠	120	アドエア250エアゾール120吸入用	848	アトロピン硫酸塩	526
アテキユラ吸入用カプセル高用量	847	アドエア500ディスクス28吸入用	848	アトロピン硫酸塩水和物	97,526,810
				アトロピン硫酸塩注各種	526
				アトロベントエロゾル20µg	840

内 用 薬



成分	規格・単位	薬価(円)	配合成分 商品名(会社名)	備考
----	-------	-------	------------------	----

112 催眠鎮静剤, 抗不安剤

〔1〕 有機ブロム化合物製剤

㊦プロモバレリル尿素	1g	7.50	プロムワレリル尿素「ホエイ」 (マイランEPD=ヴィアトリス)	㊦
適応 ①不眠症。②不安緊張状態の鎮静。 用法 ①1日1回0.5~0.8g, 就寝前又は就寝時。②1		日0.6~1g, 分3。		

〔3〕 抱水クロラル系製剤

㊦抱水クロラル	1g	36.90		㊦ ㊧
適応 不眠症。静注困難な痙攣重積状態。 用法 【経口】1回0.5~1g, 就寝前。【注腸】小児30~		50mg/kgを微温湯に溶かして使用。		

〔4〕 ベンゾジアゼピン系製剤

アルプラゾラム錠	0.4mg1錠	5.90	洗コNSTAN0.4mg錠* (武田テバ薬品=武田) 洗ソラナックス0.4mg錠* (ヴィアトリス)	㊦ ㊧
後㊦アルプラゾラム0.4mg錠	0.4mg1錠	5.70	洗アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」* (共和薬品=日本ジェネリック) 洗アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」* (メディサ=沢井) 洗アルプラゾラム錠0.4mg「トーフ」 (東和薬品)	㊦ ㊧
アルプラゾラム錠	0.8mg1錠	9.80	洗ソラナックス0.8mg錠(ヴィアトリス)	㊦ ㊧
	"	9.70	洗コNSTAN0.8mg錠* (武田テバ薬品=武田)	
後㊦アルプラゾラム0.8mg錠	0.8mg1錠	5.90	洗アルプラゾラム錠0.8mg「アメル」* (共和薬品) 洗アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」* (メディサ=沢井) 洗アルプラゾラム錠0.8mg「トーフ」* (東和薬品)	㊦ ㊧
適応 心身症(胃・十二指腸潰瘍, 過敏性腸症候群, 自律神経失調症)における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ・睡眠障害。		用法 1日1.2mg, 分3。増量の場合, 最高量1日2.4mgまで漸増, 分3~4。高齢者は1回0.4mg, 1日1~2回から開始。増量の場合1日1.2mgまで。		
エスタゾラム錠	1%1g	41.40	洗ユーロジン散1% (武田テバ薬品=武田)	㊦ ㊧
" 錠	1mg1錠	6.20	洗ユーロジン1mg錠* (武田テバ薬品=武田)	㊦ ㊧
後㊦エスタゾラム1mg錠	1mg1錠	5.90	洗エスタゾラム錠1mg「アメル」* (共和薬品=日医工)	㊦ ㊧
エスタゾラム錠	2mg1錠	10.10	洗ユーロジン2mg錠* (武田テバ薬品=武田)	㊦ ㊧

成分	規格・単位	薬価(円)	配合成分 商品名(会社名)	備考
後① エステルゾラム2mg錠	2mg1錠	7.90	後エステルゾラム錠2mg「アメル」* (共和薬品=日医工)	㊤ ㊦
適応 ①不眠症。②麻酔前投薬。 用法 ①1回1～4mg(散:0.1～0.4g), 就寝前。②麻			酔前1回2～4mg(同0.2～0.4g)。手術前夜1回1 ～2mg(同0.1～0.2g), 就寝前。	
オキサゾラム錠	10%1g	27.50	後セレナル散10% (アルフレッサファーマ)	㊤ ㊦
〃 錠	5mg1錠	5.70	後セレナル錠5* (アルフレッサファーマ)	㊤ ㊦
〃 錠	10mg1錠	5.80	後セレナル錠10* (アルフレッサファーマ)	㊤ ㊦
適応 ①神経症における不安・緊張・抑うつ・睡眠障害。 心身症(消化器疾患, 循環器疾患, 内分泌系疾患, 自律神 経失調症)における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ。			②麻酔前投薬。 用法 ①1回10～20mg(散:0.1～0.2g), 1日3回。 ②1～2mg(同0.01～0.02g)/kg, 就寝前又は手術前。	
クアゼパム錠	15mg1錠	57.50	後ドラール錠15* (久光)	㊤ ㊦
〃		32.80	後クアゼパム錠15mg「トーフ」* (東和薬品) 後クアゼパム錠15mg「日医工」*(日医工) 後クアゼパム錠15mg「MNP」* (日新製薬=MeijiSeika)	
後② クアゼパム15mg錠	15mg1錠	24.80	後クアゼパム錠15mg「アメル」* (共和薬品) 後クアゼパム錠15mg「サワイ」*(沢井) 後クアゼパム錠15mg「YD」* (陽進堂=日本ジェネリック)	㊤ ㊦
クアゼパム錠	20mg1錠	69.90	後ドラール錠20* (久光)	㊤ ㊦
〃		38.80	後クアゼパム錠20mg「トーフ」* (東和薬品) 後クアゼパム錠20mg「日医工」*(日医工) 後クアゼパム錠20mg「MNP」* (日新製薬=MeijiSeika)	
後③ クアゼパム20mg錠	20mg1錠	30.90	後クアゼパム錠20mg「アメル」* (共和薬品) 後クアゼパム錠20mg「サワイ」*(沢井) 後クアゼパム錠20mg「YD」* (陽進堂=日本ジェネリック)	㊤ ㊦
適応 ①不眠症。②麻酔前投薬。 用法 ①1回20mg, 就寝前。②手術前夜1回15～			30mg, 就寝前。以上, 1日最高30mg。	
クロキサゾラム錠	1%1g	20.10	後セバゾン散1% (アルフレッサファーマ)	㊤ ㊦
〃 錠	1mg1錠	5.70	後セバゾン錠1(アルフレッサファーマ)	㊤ ㊦
〃 錠	2mg1錠	5.80	後セバゾン錠2(アルフレッサファーマ)	㊤ ㊦
適応 ①神経症における不安・緊張・抑うつ・強迫・恐怖・ 睡眠障害。心身症(消化器疾患, 循環器疾患, 更年期障 害, 自律神経失調症)における身体症候並びに不安・緊			張・抑うつ。②術前の不安除去。 用法 ①1日3～12mg(散:0.3～1.2g), 分3。②0.1 ～0.2mg(同0.01～0.02g)/kg, 手術前。	
メンドソロン錠	7.5mg1錠	10.10	後メンドソロン錠7.5mg* (マイランEPD)	㊤ ㊦

成分	規格・単位	薬価(円)	配合成分 商品名(会社名)	備考
〔適応〕 神経症における不安・緊張・焦躁・抑うつ。			〔用法〕 1日15～30mg, 分2～4。	
㊦ クロルジアゼポキシド散	1%1g	7.30	クロルジアゼポキシド散1% 「ツルハラ」 (鶴原)	㊦ ㊧
㊦ クロルジアゼポキシド散	1%1g	7.50	コントロール散1% (武田テバ薬品=武田)	㊦ ㊧
㊦ クロルジアゼポキシド散	10%1g	34.60	コントロール散10% (武田テバ薬品=武田) バランス散10% (丸石)	㊦ ㊧
㊦ //	錠	5mg1錠	クロルジアゼポキシド錠5mg 「ツルハラ」* バランス錠5mg* 5mgコントロール錠* (武田テバ薬品=武田)	㊦ ㊧
㊦ //	錠	10mg1錠	クロルジアゼポキシド錠10mg 「ツルハラ」* バランス錠10mg* 10mgコントロール錠* (武田テバ薬品=武田)	㊦ ㊧
〔適応〕 神経症における不安・緊張・抑うつ。うつ病における不安・緊張。心身症(胃・十二指腸潰瘍, 高血圧症)における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ。			〔用法〕 成人1日20～60mg(1%散: 2～6g, 10%散: 0.2～0.6g), 分2～3。小児1日10～20mg(1%散: 1～2g, 10%散: 0.1～0.2g), 分2～4。	
ジアゼパム散	1%1g	12.20	㊦ホリゾン散1% (丸石)	㊦ ㊧
	〃	11.70	㊦セルシン散1% (武田テバ薬品=武田)	
	〃	6.30	㊦ジアゼパム散1%「アメル」(共和薬品)	
㊦ ジアゼパム錠	2mg1錠	6.00	㊦ホリゾン錠2mg* ㊦2mgセルシン錠*(武田テバ薬品=武田)	㊦ ㊧
㊦(㊦)ジアゼパム2mg錠	2mg1錠	5.70	㊦ジアゼパム錠2「サワイ」* (沢井) ㊦ジアゼパム錠2mg「タイホウ」 (大鵬薬品) ㊦ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」* (鶴原) ㊦ジアゼパム錠2「トーフ」 (東和薬品) ㊦ジアゼパム錠2mg「アメル」* (共和薬品)	㊦ ㊧
㊦ ジアゼパム錠	5mg1錠	9.40	㊦ホリゾン錠5mg* ㊦5mgセルシン錠*(武田テバ薬品=武田)	㊦ ㊧
㊦(㊦)ジアゼパム5mg錠	5mg1錠	5.80	㊦ジアゼパム錠5mg「タイホウ」 (大鵬薬品) ㊦ジアゼパム錠5mg「ツルハラ」* (鶴原) ㊦ジアゼパム錠5「トーフ」 (東和薬品) ㊦ジアゼパム錠5mg「アメル」* (共和薬品)	㊦ ㊧
㊦ ジアゼパム錠	10mg1錠	12.70	㊦10mgセルシン錠* (武田テバ薬品=武田)	㊦ ㊧
	〃	5.70	㊦ジアゼパム錠10mg「ツルハラ」*(鶴原)	
ジアゼパム液	0.1%1mL	13.60	セルシンシロップ0.1% (武田テバ薬品=武田)	㊦ ㊧

成分	規格・単位	薬価(円)	配合成分 商品名(会社名)	備考
【適応】 神経症における不安・緊張・抑うつ。うつ病における不安・緊張。心身症(消化器疾患, 循環器疾患, 自律神経失調症, 更年期障害, 腰痛症, 頸肩腕症候群)における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ。次の疾患における筋緊張の軽減/脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛。麻酔前投薬。			【用法】 (成人) 1回2~5mg(散:0.2~0.5g, シロップ:2~5ml), 1日2~4回。外来患者, 原則1日15mg以内。〔小児〕1日3歳以下1~5mg, 4~12歳2~10mg, 分1~3。〔筋痙攣患者〕1回2~10mg, 1日3~4回。〔麻酔前投薬〕1回5~10mgを就寝前又は手術前。	
後⑨トフィソパム10%細粒	10%1g	6.90	後トフィソパム細粒10%「ツルハラ」 (鶴原)	⑨
トフィソパム錠	50mg1錠	10.30	先グラダキシシン錠50* (持田)	⑨
後⑨トフィソパム50mg錠	50mg1錠	5.90	後トフィソパム錠50mg「サワイ」* (沢井) 後トフィソパム錠50mg「トーワ」* (東和薬品) 後トフィソパム錠50mg「日医工」* (日医工)	⑨
【適応】 次の疾患における頭痛・頭重, 倦怠感, 心悸亢進, 発汗等の自律神経症状/自律神経失調症, 頭部損傷, 頸部損傷, 更年期障害・卵巣欠落症状。			【用法】 1回50mg(細粒:0.5g), 1日3回。 【その他の薬効】 1239	
トリアゾラム錠	0.125mg1錠	6.50	先ハルシオン0.125mg錠* (ファイザー)	⑨ ⑨
後⑨トリアゾラム0.125mg錠	0.125mg1錠	5.70		⑨ ⑨
後トリアゾラム錠0.125mg「テバ」* (武田テバファーマ=武田)			後トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」* (アルフレッサファーマ=エルメッ ド=日医工)	
後トリアゾラム錠0.125mg「日医工」* (日医工)			後トリアゾラム錠0.125mg「FY」* (富士薬品=共和薬品)	
後トリアゾラム錠0.125mg「日新」* (日新製薬)			後トリアゾラム錠0.125mg「TCK」* (辰巳)	
後トリアゾラム錠0.125mg「CH」* (長生堂=日本ジェネリック)				
トリアゾラム錠	0.25mg1錠	9.90	先ハルシオン0.25mg錠* (ファイザー)	⑨ ⑨
後⑨トリアゾラム0.25mg錠	0.25mg1錠	5.90		⑨ ⑨
後トリアゾラム錠0.25mg「テバ」* (武田テバファーマ=武田)			後トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」* (アルフレッサファーマ=エルメッ ド=日医工)	
後トリアゾラム錠0.25mg「日医工」* (日医工)			後トリアゾラム錠0.25mg「FY」* (富士薬品=共和薬品)	
後トリアゾラム錠0.25mg「日新」* (日新製薬)			後トリアゾラム錠0.25mg「TCK」* (辰巳)	
後トリアゾラム錠0.25mg「CH」* (長生堂=日本ジェネリック)				
【適応】 ①不眠症。②麻酔前投薬。			術前夜1回0.25mg, 就寝前。年齢・症状・疾患により, 0.5mg投与可。	
【用法】 ①1回0.25mg, 就寝前。高度不眠症には0.5mg投与可。高齢者には1回0.125~0.25mgまで。②手				
ニトラゼパム錠	1%1g	12.70	先ネルボン散1% (アルフレッサファーマ)	⑨ ⑨
〃 錠	1%1g	14.70	先ベンザリン細粒1% (共和薬品)	⑨ ⑨
〃 〃	〃	6.30	後ニトラゼパム細粒1%「TCK」 (辰巳)	
〃 錠	2mg1錠	5.90	後ベンザリン錠2* (共和薬品)	⑨ ⑨

成分	規格・単位	薬価(円)	配合成分 商品名(会社名)	備考
ニトラゼパム錠	5mg1錠	8.80	Ⓐベンザリン錠5* (共和薬品)	㊦ ㊧
〃	〃	8.30	Ⓐネルボン錠5mg* (アルフレッサファーマ)	
後㊦ニトラゼパム5mg錠	5mg1錠	5.50		㊦ ㊧
後ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」* (鶴原)			後ニトラゼパム錠5mg「JG」* (日本ジェネリック)	
後ニトラゼパム錠5mg「テバ」* (武田テバファーマ=武田)			後ニトラゼパム錠5mg「NIG」* (日医工岐阜=日医工=武田)	
後ニトラゼパム錠5mg「トローワ」* (東和薬品)			後ニトラゼパム錠5mg「TCK」* (辰巳)	
ニトラゼパム錠	10mg1錠	13.80	Ⓐネルボン錠10mg* (アルフレッサファーマ) Ⓐベンザリン錠10* (共和薬品)	㊦ ㊧
後㊦ニトラゼパム10mg錠	10mg1錠	5.70	後ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」* (鶴原) 後ニトラゼパム錠10mg「JG」* (日本ジェネリック) 後ニトラゼパム錠10mg「TCK」* (辰巳)	㊦ ㊧
適應 ①不眠症。②麻酔前投薬。③異型小発作群(點頭てんかん, ミオクロヌス発作, 失立発作等), 焦点性発作(焦点性痙攣発作, 精神運動発作, 自律神経発作等)。 用法 ①1回5~10mg(散・細粒:0.5~1g), 就寝前。		② 1回5~10mg, 就寝前又は手術前。 ③ 成人, 小児とも1日5~15mg(同0.5~1.5g), 適宜分服。 (その他の薬効) 1139		
ハロキサゾラム錠	1%1g	22.60	㊦ソメリン細粒1% (アルフレッサファーマ)	㊦ ㊧
〃 錠	5mg1錠	14.40	㊦ソメリン錠5mg* (アルフレッサファーマ)	㊦ ㊧
〃 錠	10mg1錠	20.30	㊦ソメリン錠10mg* (アルフレッサファーマ)	㊦ ㊧
適應 不眠症。		用法 1回5~10mg(細粒:0.5~1g), 就寝前。		
Ⓐフルジアゼパム錠	0.25mg1錠	7.10	㊦Ⓐエリスパン錠0.25mg* (住友ファーマ)	㊦ ㊧
適應 心身症(消化器疾患, 高血圧症, 心臓神経症, 自律神経失調症)における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ		用法 1日0.75mg, 分3。		
フルタゾラム錠	1%1g	11.50	㊦コレミナル細粒1% (沢井=田辺三菱)	㊦
〃 錠	4mg1錠	7.00	㊦コレミナル錠4mg* (沢井=田辺三菱)	㊦
適應 心身症(過敏性腸症候群, 慢性胃炎, 胃・十二指腸潰瘍)における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ。		用法 1日12mg(細粒:1.2g), 分3。		
フルニトラゼパム錠	1mg1錠	9.50	㊦サイレース錠1mg* (エーザイ)	㊦ ㊧
後㊦フルニトラゼパム1mg錠	1mg1錠	5.70	後フルニトラゼパム錠1mg「アメル」* (共和薬品) 後フルニトラゼパム錠1mg「JG」* (日本ジェネリック) 後フルニトラゼパム錠1mg「TCK」* (辰巳)	㊦ ㊧
フルニトラゼパム錠	2mg1錠	10.90	㊦サイレース錠2mg* (エーザイ)	㊦ ㊧

成分	規格・単位	薬価(円)	配合成分 商品名(会社名)	備考
後(脚)フルニトラゼパム2mg錠	2mg1錠	5.90	後フルニトラゼパム錠2mg「アメル」* (共和薬品) 後フルニトラゼパム錠2mg「JG」* (日本ジェネリック) 後フルニトラゼパム錠2mg「TCK」* (辰巳)	㊤ ㊦
適応 不眠症。麻酔前投薬。 用法 1回0.5~2mg, 就寝前又は手術前。高齢者1回			1mgまで。	
フルラゼパム塩酸塩錠	15mg1錠	8.40	錠ダルメートカプセル15* (共和薬品)	㊤ ㊦
適応 不眠症。麻酔前投薬。			用法 1回10~30mg, 就寝前又は手術前。	
属プロチゾラム錠	0.25mg1錠	14.70	錠レンドルミン錠0.25mg* (日本ベーリンガー)	㊤ ㊦
後(脚)プロチゾラム0.25mg錠	0.25mg1錠	10.10		㊤ ㊦
後プロチゾラム錠0.25mg「アメル」* (共和薬品) 後プロチゾラム錠0.25mg「オーハラ」* (大原) 後プロチゾラム錠0.25mg「サワイ」* (メディサ=沢井) 後プロチゾラム錠0.25mg「テバ」* (武田テバファーマ=武田) 後プロチゾラム錠0.25mg「トーフ」* (東和薬品) 後プロチゾラム錠0.25mg「日医工」* (日医工)			後プロチゾラム錠0.25mg「日新」* (日新製薬=第一三共エスファ) 後プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」* (田辺三菱=吉富薬品) 後プロチゾラム錠0.25mg「AFP」* (アルフレッサファーマ) 後プロチゾラム錠0.25mg「CH」* (長生堂=日本ジェネリック) 後プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」* (アルフレッサファーマ=エルメッ ド=日医工) 後プロチゾラム錠0.25mg「YD」* (陽進堂)	
プロチゾラム口腔内崩壊錠	0.25mg1錠	14.70	錠レンドルミンD錠0.25mg* (日本ベーリンガー)	㊤ ㊦
後(脚)プロチゾラム0.25mg 口腔内崩壊錠	0.25mg1錠	10.10	後プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」* (共和薬品) 後プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」* (メディサ=沢井) 後プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」* (武田テバファーマ=武田) 後プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」* (大興=日本ジェネリック)	㊤ ㊦
適応 ①不眠症。②麻酔前投薬。 用法 ①1回0.25mg, 就寝前。②手術前夜1回			0.25mg, 就寝前。麻酔前1回0.5mg。	
プロマゼパム錠	1%1g	17.50	後除プロマゼパム細粒1%「サンド」 (サンド)	㊤ ㊦
"	"	17.40	☆レキソタン細粒1% (サンドファーマ=サンド)	
" 錠	1mg1錠	5.70	☆レキソタン錠1* (サンドファーマ=サンド)	㊤ ㊦
後除(脚)プロマゼパム1mg錠	1mg1錠	5.70	後除プロマゼパム錠1mg「サンド」* (サンド)	㊤ ㊦
プロマゼパム錠	2mg1錠	5.90	錠レキソタン錠2* (サンドファーマ=サンド)	㊤ ㊦
後(脚)プロマゼパム2mg錠	2mg1錠	5.70	後プロマゼパム錠2mg「サンド」* (サンド=日本ジェネリック)	㊤ ㊦

成分	規格・単位	薬価(円)	配合成分 商品名(会社名)	備考
後(株)プロマゼパム3mg錠	3mg1錠	5.90	後(株)プロマゼパム錠3mg「サンド」* (サンド)	㊞ ㊟
プロマゼパム錠	5mg1錠	9.00	先(株)レキシタン錠5* (サンドファーマ=サンド)	㊞ ㊟
後(株)プロマゼパム5mg錠	5mg1錠	5.90	後(株)プロマゼパム錠5mg「サンド」* (サンド=日本ジェネリック)	㊞ ㊟
適応 ①神経症における不安・緊張・抑うつ及び強迫・恐怖。うつ病における不安・緊張。②心身症(高血圧症、消化器疾患、自律神経失調症)における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ及び睡眠障害。③麻酔前投薬。		用法 ①1日6~15mg(細粒:0.6~1.5g),分2~3。 ②1日3~6mg(同0.3~0.6g),分2~3。③5mg(同0.5g),就寝前又は手術前。		
メキサゾラム錠	0.1%1g	12.10	先(株)メレックス細粒0.1% (アルフレッサファーマ)	㊞
” 錠	0.5mg1錠	5.90	先(株)メレックス錠0.5mg* (アルフレッサファーマ)	㊞
” 錠	1mg1錠	9.90	先(株)メレックス錠1mg* (アルフレッサファーマ)	㊞
適応 神経症における不安・緊張・抑うつ、易疲労性、強迫・恐怖・睡眠障害。心身症(胃・十二指腸潰瘍、慢性胃炎、過敏性腸症候群、高血圧症、心臓神経症、自律神経失調症)における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ・易疲		労性・睡眠障害。 用法 1日1.5~3mg(細粒:1.5~3g),分3。高齢者は1日1.5mg(同1.5g)まで。		
メダゼパム錠	2mg1錠	5.70	後(株)メダゼパム錠2(ツルハラ)* (鶴原) ☆レスミット錠2* (共和薬品)	㊞ ㊟
” 錠	5mg1錠	5.70	後(株)メダゼパム錠5(ツルハラ)* (鶴原) ☆レスミット錠5* (共和薬品)	㊞ ㊟
適応 神経症における不安・緊張・抑うつ。心身症(消化器疾患、循環器疾患、内分泌系疾患、自律神経失調症)に		おける身体症候並びに不安・緊張・抑うつ。 用法 1日10~30mg。		
ロフラゼパ酸エチル錠	1%1g	151.00	先(株)メイラックス細粒1% (MeijiSeika)	㊞ ㊟
” 錠	1mg1錠	5.90	後(株)ロフラゼパ酸エチル錠1mg「日医工」* (日医工)	㊞ ㊟
先(株)ロフラゼパ酸エチル錠	1mg1錠	11.60	先(株)メイラックス錠1mg* (MeijiSeika)	㊞ ㊟
後(株)ロフラゼパ酸エチル1mg錠	1mg1錠	5.90	後(株)ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」* (沢井) 後(株)ロフラゼパ酸エチル錠1mg「トーワ」* (東和薬品) 後(株)ロフラゼパ酸エチル錠1mg「SN」* (シオノ=ヴィアトリス=日医工=武田)	㊞ ㊟ ㊞ ㊟
先(株)ロフラゼパ酸エチル錠	2mg1錠	18.30	先(株)メイラックス錠2mg* (MeijiSeika)	㊞ ㊟
”	”	9.30	後(株)ロフラゼパ酸エチル錠2mg「サワイ」* (沢井) 後(株)ロフラゼパ酸エチル錠2mg「トーワ」* (東和薬品) 後(株)ロフラゼパ酸エチル錠2mg「SN」* (シオノ=ヴィアトリス=日医工=武田)	㊞ ㊟ ㊞ ㊟
後(株)ロフラゼパ酸エチル2mg錠	2mg1錠	8.50	後(株)ロフラゼパ酸エチル錠2mg「日医工」* (日医工)	㊞ ㊟